

SYNTHÈSE DU COMPTAGE WETLANDS DES ANATIDÉS ET FOULQUES (JANVIER 2007)

Frédéric GUYOMARD

Au niveau national, le dénombrement Wetlands des anatidés et des foulques a connu une couverture particulièrement importante (98 % contre une moyenne de 94-95 %). Les effectifs globaux sont en baisse de 8 % par rapport à 2006 mais dépasse le millions d'oiseaux, et se situent a peu près au même niveau que 2004 et 2005.

Au niveau régional, le golfe du Morbihan n'a pas hébergé plus de 20 000 oiseaux (17 269), première fois depuis 2000.

Pour les Côtes-d'Armor

Il apparaît à la lecture du tableau 1, que durant le wetlands de janvier 2007 notre département n'a pas accueilli d'espèces particulières et il s'agit même de la plus faible diversité observée depuis 2000.

Sans surprise, les sites côtiers sont les plus fréquentés, en premier lieu, la baie de Saint-Brieuc, suivi de la Rance et des estuaires du Trieux et du Jaudy-baie de Paimpol avec pour ces 3 sites entre 2 000 et 10 000 anatidés et foulques recensés. La baie de Perros-Guirec-Île grande et la baie de la Fresnaye ont accueilli quant à eux entre 500 et 2000 individus. La baie de Lannion ainsi que les étangs intérieurs de l'ouest, moins de 500 anatidés et foulques. Les autres sites du 22 (tableau 2).

Enfin, il est mentionné, cette année, 2 sites d'importance internationale pour la Bernache cravant (*ont accueilli plus de 1 % de la population biogéographique – RAMSAR*), à savoir, la baie de Saint-Brieuc et la baie de Paimpol-estuaires du Jaudy et du Trieux (tableau 3).

Bibliographie

- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2008. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2007*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2007. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2006*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2006. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2005*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2005. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2004*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2004. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2003*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2003. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2002*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2002. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2001*, rapport WI/LPO.
- DECEUNINCK (B.) et MAILLET (N.), 2001. – *Synthèse des dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France à la mi-janvier 2000*, rapport WI/LPO.

	Tadorne de Belon	Canard siffleur	Canard chipecau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule Milouin	Fuligule morillon	Fuligule milouinan	Eider à duvet	Macreuse noire	Macreuse brune	Garrot à œil d'or	Harle huppé	Harle piette	Foule macroule	Cygne tuberculé	Oie rieuse	Bernache cravant	Nb total d'espèces
2007	x	x	x	x	x	x	x		x				x			x		x	x		x	13
2006	x	x	x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x		x	x		x	16
2005	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x		x			x	16
2004	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	18
2003	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	17
2002	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		x		x	x	17
2001	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x		x	17
2000	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x			x		x	x	16

Tableau 1 – Liste des espèces recensées pendant les dénombrements wetlands de 2000 à 2007 en Côtes-d'Armor.

	Tadorne de Belon	Canard siffleur	Canard chipecau	Sarcelle d'hiver	Canard colvert	Canard pilet	Canard souchet	Fuligule milouin	Eider à duvet	Macreuse noire	Harle huppé	Foule macroule	Cygne tuberculé	Bernache cravant
Baie de Lannion	x				x							x		x
Baie de Perros-Guirec et Île-Grande	x				x						x		x	x
Estuaire du Jaudy, du Trieux et baie de Paimpol	x	x		x	x	x					x			x
Baie de Saint-Brieuc	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x
Baie de la Fresnaye, St-Jacut-de-la-Mer	x				x				x	x	x			x
Rance	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		x
Étangs intérieurs ouest					x							x		

Tableau 2 – Présence des différentes espèces sur les différents sites des Côtes d'Armor.

	Baie de Paimpol – Estuaires du Jaudy et du Trieux	Baie de Saint-Brieuc	Baie de la Fresnaye – Saint-Jacut-de-la-Mer
2007	oui	oui	
2006		oui	
2005	oui	oui	oui
2004		oui	
2003	oui	oui	
2002		oui	oui
2001		oui	
2000		oui	

Site d'importance internationale pour la bernache cravant en Côtes-d'Armor depuis 2000 recensés lors des comptages Wetlands