

Aigle botté

Hieraaetus pennatus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, l'Aigle botté niche dans le Paléarctique entre 30°N et 60°N et hiverne en Afrique subsaharienne (**D**). En France, il s'agit d'un nicheur et migrateur rare (400 à 650 couples dans les années 2000) fréquentant les milieux forestiers du centre et du sud-ouest du pays (**D**). En Bretagne, l'Aigle botté a pu nicher au XIX^e s. comme l'indiquent des reproductions à la frontière de la Loire-Atlantique mais l'espèce est désormais devenue un migrateur très rare dans la région (**C**).

Trois observations ont été signalées en Côtes-d'Armor :

- 1 individu de forme claire près des îles Lavrec et Logodec à proximité de Bréhat le 25 août 1999
- 1 individu de forme sombre à variante pâle près de l'étang de l'Ecoublière (Trébédan) le 11 septembre 2002 (**Le Provost, 2002**).
- 1 individu au château de Trégarantec (Mellionec) le 13 mars 2006.

Bibliographie

Le Provost M. (2002). Note sur l'observation d'un Aigle botté à l'étang de l'Ecoublière/Trébédan. *Le Fou*, 58 : 3-4.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances*. Saint-Brieuc, 416 p.

