

# Bécasseau maubèche

*Calidris canutus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Bécasseau maubèche se reproduit dans l'Arctique, entre le nord du Canada et l'est de la Sibérie. En période internuptiale, il se répartit sur les littoraux des cinq continents. Le statut de conservation de cette espèce chassable en France est considéré de *Préoccupation mineure* sur la Liste Rouge de l'UICN (**U**); et en SPEC 3 en Europe (espèce non concentrée en Europe mais dont le statut y est défavorable) (**R**). Parmi les 6 populations actuellement identifiées et considérées comme sous-espèces, seules deux fréquentent la France: *C.c. islandica* et *C.c. canutus*. La sous-espèce nominale fréquente le littoral français en migration et plus particulièrement la façade centre atlantique. La sous-espèce *islandica* hiverne sur différents sites du littoral Manche-Atlantique dont les Côtes-d'Armor. La population de *C.c. islandica* est estimée à 450 000 individus dont 8 % hivernent en France (**Stroud et al., 2004**). Après une augmentation de 1970 à 1990 et un pic observé en 1992, les effectifs sont aujourd'hui en diminution (**Stroud et al., 2004**).

Si la sous-espèce *islandica* est aujourd'hui considérée comme menacée en Europe en raison d'un léger déclin, lié à des baisses significatives d'effectif en Angleterre et aux Pays-Bas, la part de la population hivernant en France reste globalement stable


(36 000 individus) ce qui confère à la France une responsabilité dans le maintien des effectifs de l'espèce (**B**).

## Statut en Côtes-d'Armor

La présence d'effectifs d'importance nationale est régulière sur le littoral costarmoricain. Sur la période 2000-2009, le littoral accueille en moyenne 8,9 % de la population hivernante française à la mi-janvier, soit 3 180 individus (**W**). Les zones les plus fréquentées sont la baie de Saint-Brieuc (2 693 ind. en moyenne) et l'ensemble baie de Lannion/Saint-Efflam (380 ind. en moyenne). D'autres sites comme les ensembles Ile-Grande/baie de Trégastel/de Perros-Guirec et de la Fresnaye (Saint-Jacut-de-la-Mer) accueillent régulièrement le Bécasseau maubèche avec des effectifs toutefois moins importants (respectivement 99 et 7 ind. en moyenne).

En baie de Saint-Brieuc, on observe régulièrement une augmentation des effectifs sur la Réserve Naturelle à partir de septembre. Après un maximum atteint au mois de janvier, les effectifs diminuent ensuite brutalement en mars puis jusqu'à fin avril, début mai. Un pic d'individus en migration pré-nuptiale apparaît certaines années (1999, 2002, 2007

**Bécasseau maubèche Répartition hivernale (2009-2013)**



Auteur : Anthony Sturbois & Alain Ponsoero  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

# Bécasseau maubèche

*Calidris canutus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

et 2008). Quelques individus peuvent être observés sur le site au cours de l'été. Les arrivées les plus importantes sont recensées durant l'hiver (mois de novembre et janvier notamment) et les plus gros départs ont lieu au mois de février, mars et avril. Certains hivers, les effectifs présents sur le site atteignent ou dépassent le seuil d'importance internationale comme ce fut par exemple le cas en janvier 1998 (4500 ind.), en décembre 1999 (5150 ind.) et en janvier 2002 (5000 ind.) (V). L'espèce peut également être observée en petits groupes ou à l'unité sur l'ensemble du littoral et occasionnellement sur quelques sites intérieurs (Plougras en octobre 1991, Plounérin à la mi-août 2010 et Glomel en septembre 2008), notamment en migration pré ou postnuptiale. Il peut alors être observé en alimentation sur de petites vasières ou en repos, souvent accompagné d'autres limicoles.


## Tendances et perspectives

Aucune tendance significative des effectifs hivernants n'a été mise en évidence sur la période 2000-2009 (W). En ce qui concerne la baie de Saint-Brieuc qui rassemble l'essentiel des oiseaux, les effectifs sont également stables sur la période 1990-2000 (V). L'essentiel des Bécasseaux mau-

bèches hivernant en France bénéficie de mesure de protection, ce qui explique peut-être la situation favorable de l'espèce sur le littoral français. C'est le cas en Côtes-d'Armor où l'essentiel des effectifs se concentre sur la Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Des études sur le régime alimentaire et les zones d'alimentation sont d'ailleurs en cours sur cette zone et apporteront des éléments intéressants sur l'écologie locale de l'espèce en vue d'améliorer sa conservation. Il serait par ailleurs intéressant d'étudier, en parallèle, l'impact des activités humaines (chasse, pêche à pied, conchyliculture, sport nature...). A noter également l'analyse des 36 données de contrôles en Côtes-d'Armor d'individus marqués couleur dans le cadre du programme de la station NIOZ (mer des Wadden), qui met en évidence une fidélité aux sites d'hivernage ainsi que des échanges entre les différents sites des Côtes-d'Armor et de Bretagne Nord.

## Bibliographie

**Stroud D.A., Davidson N.C., West R., Scott D-A., Haanstra L., Thorup O., Ganter B. & Delany S. (2004).** Status of migratory wader populations in Africa and Western Eurasia in the 1990s. *International Wader Study Group*, 259 p.



Auteur : Anthony Sturbois & Alain Ponsoero  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.