

# Bécasse des bois

*Scolopax rusticola*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

La Bécasse des bois est très largement distribuée du Japon aux côtes atlantiques européennes. Son aire stricte de reproduction comprend essentiellement la Fennoscandie, les Pays baltes, la Russie, la Biélorussie et les pays d'Europe centrale. L'aire stricte d'hivernage concerne le pourtour de la Méditerranée et l'Asie. Les îles Britanniques et la France se situent au cœur d'une zone intermédiaire où l'espèce est présente toute l'année (**Ferrand & Gossman, 2001**; **S**; **EB**). La population globale comprendrait 10 à 26 millions d'individus (**WI**) mais les estimations d'effectifs de cette espèce migratrice aux mœurs discrètes restent délicates. En France, l'espèce est migratrice et hivernante commune. En hivernage, les effectifs les plus importants sont recensés sur le littoral Manche-Atlantique ainsi que sur les bords de la Méditerranée. L'espèce est en revanche considérée comme nicheuse rare. L'aire de nidification concerne plus particulièrement la moitié est du pays (bassin Parisien, quart nord-est, régions montagneuses ; **Ferrand & Gossman, 2009**; **D**). En France, les populations nicheuses et hivernantes sont suivies depuis le début des années 1990. Les effectifs reproducteurs sont mal connus, probablement 10 000 à 20 000 couples dans les années 2000 (**D**). Ces évaluations sont fondées sur l'observation des mâles à la croule dans le cadre du Réseau bécasse coordonné par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération Nationale des Chasseurs et les Fédérations Départementales de Chasseurs. En automne/hiver le suivi des hivernants est basé sur la mesure de l'Indice d'Abondance Nocturne (IAN) collecté par les bagueurs de ce même réseau, et l'Indice Cynégétique d'Abondance (ICA) récolté par les membres du CNB (**Ferrand et al., 2006**). La Bretagne n'accueille que de très rares reproducteurs. Sur la période 1970-2014, seulement 5 preuves certaines de nidification ont été recensées en Bretagne, dans le Morbihan (3) dans le Finistère (1) et en Loire-Atlantique (1).

## Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Bécasse des bois n'a jamais été observée reproductrice. L'essentiel des données concernant la répartition et la phénologie de l'espèce sont collectées par les services techniques de l'ONCFS et la Fédération départementale des chasseurs dans le cadre du Réseau national bé-

casse. Les données des ornithologues sont plus lacunaires bien qu'elles permettent de constater la présence de l'espèce dans des sites moins conventionnels : jardins, parcs... Beaucoup de données sont également obtenues la nuit dans les phares de voiture avec des oiseaux fréquemment posés sur les routes. Les premiers migrateurs postnuptiaux arrivent dès la fin du mois d'octobre mais l'essentiel de la migration se déroule de novembre à décembre. La migration pré-nuptiale est quant à elle observée de fin février à début avril, la plupart des retours s'effectuant au cours du mois de mars (**D**). L'analyse des indices d'abondance nocturnes et de la chronologie des prélèvements confirme ce phénomène migratoire. En hiver, la Bécasse des bois est largement distribuée sur le département avec une prédilection pour les massifs forestiers et secteurs boisés bordés de prairies permanentes pâturées (Loudéac, La Hunaudaye, Lorges, Avau-gour-Bois Meur, Beffou...) mais également plus localement dans certaines landes et marais. La carte de répartition met en évidence une distribution plus importante à l'ouest du département qui est caractérisé par un taux de boisement supérieur. La présence à l'est du département est toutefois fortement sous-évaluée en raison de la méconnaissance de nombreuses observations et d'un effort de prospection probablement moins important. Même s'il existe des variabilités individuelles de comportement, la Bécasse des bois tend à s'abriter en milieu fermé la journée (boisement, landes, haies...) et à sortir la nuit pour s'alimenter principalement de lombrics sur les prairies permanentes pâturées (**Duriez, 2003**).



Auteur : Olivier Augé, Olivier Primas & Anthony Sturbois  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

# Bécasse des bois

*Scolopax rusticola*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Les densités en hivernage sont très variables.

Des recensements au chien d'arrêt ont permis de mettre en évidence des densités moyennes pouvant aller de 10 à 30 bécasses pour 100 ha sur certains massifs forestiers mis en réserve de chasse : Bef-fou, Avaugour-Bois Meur, Lann Ar Warem) (**FDC22, 2013**). Le baguage est un outil important pour le suivi de l'espèce. Ainsi, 2027 individus ont été bagués en Côtes-d'Armor entre 1983 et 2014 et l'espèce se classe 3<sup>e</sup> espèce la plus baguée dans le département entre 2000 et 2010, derrière le Pigeon ramier et le Goéland argenté (**Iliou & Hémerly, 2012**). Les reprises d'oiseaux permettent de déterminer qu'une grande partie des hivernants bretons proviennent du flux fenno-scandinave (**Bauthian et al., 2007**). De nombreux exemples de la fidélité (saisonnière et interannuelle) de l'espèce à ses sites d'hivernage ont par ailleurs pu être mis en évidence. C'est par exemple le cas d'un individu bagué sur une prairie à Pleumeur-Bodou en 1984 et contrôlé en 1985 et 1986 sur la même parcelle, ou d'un autre individu bagué à Beffou en 2004 et contrôlé au même endroit en 2014. S'il est admis que la Bécasse des bois se cantonne sur ses quartiers d'hiver à partir de la mi-décembre, des mouvements erratiques ultérieurs en direction du littoral sous l'effet d'importantes chutes de température peuvent également être observés. Ce fut notamment le cas lors de la vague de froid prolongée de février 2012. La valeur de l'IAN collecté à Trébeurden (site témoin) est alors passée de 5 oiseaux observés en moyenne par heure de prospection à 9 oiseaux par heure. Dans ces conditions climatiques extrêmes, des interdictions temporaires de chasse de plusieurs jours sont décidées par Arrêté Préfectoral sur la base des observations du protocole national *Vague de froid*.

## Tendances et perspectives

La tendance globale d'évolution des populations est actuellement discutée. L'effectif de la population hivernante de Bécasse des bois est considéré comme stable en Europe (**Ferrand & Gossmann, 2001**). Le succès reproducteur et les conditions météorologiques hivernales rencontrées déterminent l'importance du flux migratoire et de l'hivernage de l'espèce dans l'ouest de l'Europe. En France, une tendance à la hausse des indices d'abondance est observée depuis le milieu des années 1990 (réseau

Bécasse ONCFS/FNC/FDC, 2013). Le tableau de chasse concerne entre 20000 et 30000 oiseaux par an en Côtes-d'Armor et reste stable sur la période 2006-2013. Une légère augmentation de l'IAN est observée sur la période 2009-2014 en Côtes-d'Armor, mais le recul est insuffisant pour définir une tendance certaine d'évolution des populations hivernantes. L'espèce est considérée comme modérément en déclin et provisoirement *Vulnérable* en hiver (**B**). Les principales menaces recensées sur les sites d'hivernage sont la pression de chasse, la perte d'habitat (notamment la diminution des prairies permanentes pâturées), la raréfaction du bocage ancien ou encore l'apparition de vague de froid intense avec gel prolongé... Le maintien de la pression d'étude exercée sur cette espèce à partir des multiples indicateurs et outils disponibles (IAN, ICA, baguage, suivi des prélèvements...) auxquels s'ajoutent des mesures de gestion (carnet de prélèvement, prélèvement maximum autorisé, protocole grand froid, mise en réserve) sont indispensables pour mieux connaître et conserver les populations de Bécasse des bois en Côtes-d'Armor.

## Bibliographie

- Bauthian I., Gossmann F., Ferrand Y. & Julliard R. (2007)**. Quantifying the origin of migrating bird. The case of European Woodcock wintering in France. *J. Wildlife Management*, 7 : 1(3).
- Duriez O. (2003)**. Stratégies individuelles d'hivernage chez la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*) : compromis énergétiques pour la sélection de l'habitat. Thèse de doctorat de l'Université de Paris VI, 228 p.
- Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor (2013)**. Suivi de l'hivernage de la Bécasse des bois en Côtes-d'Armor. 26 p.
- Ferrand Y. & Gossmann F. (2009)**. La Bécasse des bois, histoire naturelle. Effet de lisière. 224 p.
- Ferrand Y., Aubry P., Gossmann F., Bastat C. & Guénézan M. (2006)**. Monitoring of the European Woodcock populations, with special reference to France. Communications of the 10th American Woodcock Symposium, Roscommon, Michigan.
- Ferrand Y. & Gossmann F. (2001)**. Elements for a Woodcock (*Scolopax rusticola*) management plan. *Game and Wildlife Science*, 18(1) : 115-139.
- Iliou B. & Hémerly F. (2012)**. Le baguage des oiseaux en Bretagne : un outil de connaissance. *Ar Vran*, 23(1) : 29-50.

Auteur : Olivier Augé, Olivier Primas & Anthony Sturbois  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

