

# Bécassine sourde

*Lymnocyptes minimus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

La Bécassine sourde se reproduit de la Fennoscandie à la Sibérie orientale (D). C'est une migratrice et une hivernante peu commune qui fréquente les marais et les prairies humides, plus exceptionnellement le littoral (D). En France, le nombre de migrateurs et d'hivernants est inconnu mais très probablement supérieur à 100 000 individus au regard des prélèvements cynégétiques (50 000 individus en 1998/1999) (D). La Bécassine sourde est de passage en France dès la mi-août (rare) mais surtout de mi-septembre à fin décembre avec un pic observé fin octobre. Le passage pré-nuptial se déroule quant à lui de fin mars/début avril à fin mai (D).

## Statut en Côtes-d'Armor



Le faible nombre d'observation de Bécassines sourdes réalisées en Côtes-d'Armor, traduit un statut de migrateur et d'hivernant peu commun. Comme pour la Bécassine des marais, les mœurs discrètes compliquent l'amélioration de la connaissance sur la distribution de l'espèce. Durant l'enquête hivernants 2009-2013, l'espèce n'a été observée que sur 8 mailles réparties de l'intérieur (étangs de Lamballe, du Moulin Neuf, de Bosméléac...) au littoral (fond de baie de Saint-Brieuc, Paimpol, marais du Quellen, Plestin-les-Grèves, Plougrescant, Pleudihen-sur-Rance).

La distribution mensuelle de l'ensemble des observations réalisées en Côtes-d'Armor confirment globalement le pattern d'apparition en France (98 % des observations d'août à avril). La grande dis-

crétion de l'espèce explique l'absence de mise en évidence des pics de migration. A l'inverse le pic d'observation de janvier est certainement lié à un effort d'observation accru dans le cadre du *Wetlands*. Quelques Bécassines sourdes sont contactées et baguées par le service départemental des Côtes-d'Armor de l'ONCFS dans le cadre de prospections destinées à capturer la Bécassine des marais. Treize oiseaux ont ainsi été bagués depuis 2004 sur les communes de Camlez, Kermaria-Sulard, Maël-Carhaix, Matignon, Plounérin et Saint-Agathon. Quelques individus sont par ailleurs prélevés à la chasse sur le domaine public maritime notamment sur le secteur de Lancerf (Plourivo) et à Kermouster (Lanmodez).

## Tendances et perspectives

Autrefois qualifiée de commune en France, la Bécassine sourde est progressivement devenue moins fréquente suite au déclin qui s'est opéré dans la seconde moitié du XX<sup>e</sup> s. (même si les précisions chiffrées font défaut) (D). Le peu de donnée ne permet pas de définir de tendances pour le département. Comme pour la Bécassine des marais la dégradation générale des zones humides et peut-être aussi l'impact cynégétique ont contribué à cette diminution des effectifs (D). Un effort de prospection serait à mener dans les milieux favorables pour améliorer la connaissance sur la distribution de cette espèce des plus discrètes.



Auteur : Jean-Michel Erraud & Anthony Sturbois  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.