

Bergeronnette grise

Motacilla alba



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

La Bergeronnette grise est une espèce polytypique présente en Eurasie et en Afrique du Nord (Maroc). En Europe, elle n'occupe en hiver qu'une infime partie à l'ouest et au sud. La Bergeronnette grise est représentée par de nombreuses sous-espèces au sein de son aire de répartition. En France, seules 2 sous-espèces peuvent être observées en fonction de la saison : *alba* et *yarrelli*, cette dernière nichant essentiellement au Royaume-Uni. La population mondiale est estimée entre 8 et 14 millions d'individus dont 1 million en France (D). En hiver, les populations françaises sont nettement alimentées par les populations anglaises migratrices. La Bergeronnette grise affectionne particulièrement les lieux ouverts à végétation rase tels que les terrains agricoles, les pâtures, les étendues de bord de mer (estran), mais également les milieux plus anthropisés comme les parkings, les zones commerciales et industrielles. L'espèce n'est guère dérangée par la présence de l'homme puisque dans la majorité des cas, il lui procure son alimentation et son habitat.

Statut en Côtes-d'Armor

La Bergeronnette grise est une espèce commune et largement distribuée en Côtes-d'Armor. En période

de nidification, les densités de nicheurs sont faibles mais peuvent être très variables en fonction des secteurs. Comme en témoigne l'atlas Saint-Brieuc/Plérin (P) l'espèce peut être observée partout, en ville comme en campagne, dès lors que les habitats y sont ouverts et présentent des cavités (bâtiments, tas de bois et de pierre...). Les indices certains de nidification, nombreux car facilement détectables (transports de nourriture) ne concernent que la sous-espèce *alba*. Quelques rares hybridations entre les deux sous-espèces sont néanmoins relatées comme en 1990 à Pleubian (Le Roy, 1990). Le transit migratoire, qui débute la première décade de septembre et se prolonge jusqu'en novembre, présente un pic de passage au début du mois d'octobre. Au cours des suivis de la migration postnuptiale, la Bergeronnette grise est plus abondante que ses cousines proches (Bergeronnettes des ruisseaux et printanière). L'identification des différentes sous-espèces lors des suivis n'est pas possible mais doit concerner une part non négligeable de *yarrelli*, cette sous-espèce étant présente du mois d'octobre au mois de mars (Le Roy, 1990). De manière générale, la Bergeronnette grise est toujours située dans les 20 espèces les plus abondantes au



Auteur : Sébastien Théof
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Bergeronnette grise

Motacilla alba



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

cours de la migration d'automne. Lors de la migration de printemps, le passage pré-nuptial demeure pour sa part inconnu du fait d'un transit plus diffus. Si les densités sont relativement faibles en période de reproduction, il en est tout autrement en hiver. Certains groupes, observables à la tombée de la nuit, forment ainsi d'importants dortoirs (quelques dizaines à milliers d'individus) notamment sur les toits en zone urbaine ou périurbaine (grandes surfaces, bâtiments publics, gares, hôpitaux, ponts ou même bateaux). Le plus grand de ces dortoirs connus se trouve à l'hôpital de Saint-Brieuc (2600 à 2800 en novembre 2009). D'autres secteurs du centre-ville et des zones commerciales sont également identifiés tel ce rassemblement de 1500 et 2000 ind. en décembre 1991 sur des platanes. En dehors de la période de reproduction, la Bergeronnette grise peut être observée sur l'ensemble du département, les quelques lacunes de répartition hivernale étant liées à un manque de prospection. A cette période, l'espèce ne fréquente pas beaucoup les jardins et encore moins les mangeoires.

Relevée dans moins de 20 % des sites suivis lors du compage *Oiseaux des jardins* (K), l'espèce est davantage observée dans les zones urbaines, près d'espaces ouverts ou des zones rurales à proximité de fermes ou de terrains agricoles.


Tendances et perspectives

Les populations de Bergeronnette grise sont stables en Europe et en France (B; J). Favorisée par les activités humaines, l'espèce profite grandement de l'artificialisation croissante et ne nécessite donc aucune mesure de protection spécifique. Quelques défauts de connaissance résident dans le passage migratoire, le fonctionnement des dortoirs ou encore le succès de reproduction.

Bibliographie

Le Roy R. (1990). Note sur la Reproduction d'une Bergeronnette de Yarrell à Pleubian- Août 1990. *Le Fou*, 23: 4-5.

Bergeronnette grise Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Sébastien Théof
Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances.* Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE

