

Bergeronnette printanière/ flavéole

Motacilla flava/flavissima



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Espèce polytypique, la Bergeronnette printanière se reproduit de l'Afrique du Nord à la Sibérie en passant par l'Europe (D). En France, se reproduisent plusieurs sous-espèces et la Bretagne en accueille deux : *flava* surtout présente au sud de la région et *flavissima* (dite Bergeronnette flavéole et originaire des îles Britanniques) qui colonise surtout le littoral nord et ouest et a fortement régressé entre les deux dernières enquêtes régionales (C). Cette espèce migratrice nicheuse occupe, en Bretagne, les herbous littoraux, les prairies subhalophiles ou les prairies hygrophiles de certains marais. Elle est notamment bien présente en baie du Mont-Saint-Michel, dans les marais de Dol (surtout *flavissima*) et dans le golfe du Morbihan (*flava*).

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Bergeronnette flavéole est une nicheuse et migratrice rare et localisée et la Bergeronnette printanière une nicheuse et migratrice très rare. Les deux formes colonisent souvent en sympatrie les herbous et certains polders du fond de baie de Saint-Brieuc (quelques couples),

de l'estuaire de la Rance (moins de 20 couples en 2002 ; **Février, 2002**) et de quelques estuaires du nord-est du département. La Bergeronnette flavéole y est toujours majoritaire (14 couples de flavéoles pour 5 couples de printanières en 2002 sur l'estuaire de la Rance ; **Février, 2002**). A noter le signalement d'hybrides (dits Bergeronnette de la Manche) entre les deux sous-espèces en baie de Saint-Brieuc (1 cas) et sur l'estuaire de la Rance en 2001 et 2002 (**Février, 2002**). Dans le département, la Bergeronnette flavéole connaît une contraction de sa distribution depuis les années 1980 avec une disparition du Sillon de Talbert (Pleubian) et une réduction des populations sur le littoral nord-est (C). Dans le même temps, la forme type s'est au contraire développée avec désormais 5 mailles occupées (contre 2 en 1980-1985 ; A), même s'il s'agit souvent de couples isolés. Au total, la population départementale n'excède pas quelques dizaines de couples, sans doute moins de 30, essentiellement représentées par la forme *flavissima* et concentrées dans l'est du département et tout particulièrement sur l'estuaire de la Rance. Au printemps, de

Bergeronnette flavéole Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Bergeronnette printanière/ flavéole

Motacilla flava/flavissima



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

début avril à mi-mai, puis en fin d'été (fin août à fin septembre), les deux formes peuvent être contactées en migration, essentiellement sur des zones littorales (marais, prairies humides, îles, dunes, falaises) et plus rarement dans les terres, généralement à proximité de zones humides (étangs, marais, prairies humides). Sur le site de migration de la Cotentin (Planguenoual), la précocité des passages ne permet pas une bonne détection mais 20 oiseaux ont pu être notés en 2012 (**T**). De manière générale, les migrateurs sont observés à l'unité ou en petits groupes, rarement plus de 10 oiseaux : record de 40 ind. en baie de Lanceux (Ploubalay) le 16 avril 1993.

Tendances et perspectives

La Bergeronnette printanière est jugée globalement stable ou en léger déclin en Europe (**B**) et a connu une forte extension en France depuis les années 1980 (*flava*) du fait de la colonisation des plaines céréalières (**D**). La Bretagne et les Côtes-d'Armor forment un cas particulier avec la cohabitation de deux sous-espèces dont les interactions, hybridations et introgressions sont encore mal connues et méritent un suivi attentif d'autant plus que les populations locales, très morcelées et réduites, restent dépendantes de biotopes très particuliers et restreints.

Bergeronnette printanière Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE

