

Bernache à cou roux

Branta ruficollis




Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

La Bernache à cou roux est une espèce monotypique nichant en Sibérie occidentale dans la presqu'île du Taïmyr. Elle hiverne à l'ouest de la mer Caspienne, en Turquie, Irak et dans les Balkans (Y). En France, elle est une migratrice et hivernante rare avec 39 données pour 40 individus au XX^e s. Les observations, en augmentation, sont à mettre en relation avec l'essor de l'ornithologie de terrain et avec l'augmentation des observations en Europe de l'Ouest, liée à l'hivernage plus occidental en Bulgarie et Roumanie. Sa présence prépondérante en décembre, début janvier et fin février, n'est pas liée à des vagues de froid mais aux afflux d'autres oies, particulièrement la Bernache nonnette (D). L'origine sauvage peut être douteuse en dehors de cette période, tant l'espèce est détenue en captivité.

En Côtes-d'Armor, la Bernache à cou roux a été notée au cours de 6 hivers, systématiquement à l'unité : en novembre et décembre 1994 dans la baie de Saint-Brieuc, en octobre 1997 dans la baie de la Fresnaye, en janvier 2001 et février 2002 dans la baie de Saint-Jacut-de-la-Mer, en janvier 2006 dans la baie de Saint-Brieuc, en décembre 2010 et janvier 2011 à Ploubalay et en décembre 2011 à Pleudihen-sur-Rance. La période, les sites et l'effectif semblent dans chacun de ces cas plaider pour une origine sauvage. Même si la présence de la Bernache à cou roux reste occasionnelle, cette espèce est susceptible d'être observée de nouveau sur les sites accueillant des populations importantes d'anatidés hivernants.

Bernache à cou roux Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Alain Beuget

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

