

# Bihoreau gris

*Nycticorax nycticorax*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Le Bihoreau gris se reproduit dans les zones tempérées du Paléarctique avec une distribution irrégulière au travers des zones humides européennes. Il hiverne majoritairement en Afrique mais aussi régulièrement sur le pourtour méditerranéen comme en Camargue (**X**). En France, l'espèce est un nicheur peu commun dans les deux tiers sud du pays, un migrateur peu commun et un hivernant rare (**D**). Après 1975, date de la protection des Ardéidés, l'espèce a connu une progression de son aire de répartition en franchissant notamment le nord de la Loire. En Bretagne, l'espèce niche de manière irrégulière sur le littoral atlantique et demeure surtout très présente en Loire-Atlantique (261 couples en 2007) (**C**). En Côtes-d'Armor, l'espèce a été contactée seulement à 7 reprises (toujours des individus isolés à l'exception d'un vol migratoire) entre 1983 et 2014, les données s'étalant de Pleumeur-Gautier à la Rance. Les dunes de Bon Abri (Hillion) ont été le premier site à accueillir un immature le 20 août 1983. Le 25 avril 1988, 1 adulte est présent à la station de pompage de Lanleff. Le 21 mars 1993, 1 individu est présent à la Moignerie (Plouër-sur-Rance). Le 21 juillet 2004, un individu est observé au rocher Fumoy (La Vicomté-sur-Rance). Le 5 septembre 2004, 1 vol de 6 individus en direction sud-ouest est observé à l'aube à la Touchefais (Trélivan). Le 27 mai 2012, 1 adulte nuptial est observé en compagnie d'un Héron cendré sur un petit étang de moins de 2000 m<sup>2</sup> à Milin Kervegan (Pleumeur-Gautier). Enfin, 1 individu est contacté le soir du 11 juin 2014 au lieu-dit Les Marais à Hillion.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

