

Blongios nain

Ixobrychus minutus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Blongios nain niche de l'Europe à la Russie au sud du 60°N après un hivernage au sud du Sahara. En France, l'espèce est devenue rare avec une population nicheuse estimée à 500-800 couples en 2006 contre 2000 couples en 1968. Les données de reproduction sont rares en Bretagne et essentiellement liées aux grandes zones humides du littoral atlantique (baie d'Audierne, Trévignon...) (**C**). Malgré de grands marais apparemment propices à l'espèce, celle-ci ne niche pas en Bretagne (**D**). En Côtes-d'Armor, 1 mâle a été observé le 19 mai 1974 sur l'étang de Beffou à Plougras sans qu'aucun indice de nidification ne soit relevé (**Guermeur, 1983**). Il faudra ensuite attendre le 4 août 1985 pour une seconde observation dans le département: un vol migratoire de 7 individus au-dessus des landes du Pont Rouault à Planguenoual.

Bibliographie

Guermeur Y. (1983). Notes d'ornithologie bretonne du 16 mars 1974 au 15 novembre 1975. *Ar Vran*, 10: 1-56.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances*. Saint-Brieuc, 416 p.

