

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

Espèce sédentaire ou partiellement migratrice des régions boréales et tempérées d'Europe, le Bouvreuil pivoine se rencontre de la Scandinavie aux Pyrénées espagnoles, et jusqu'à la Turquie (D). En France, il est présent sur quasiment l'ensemble du territoire, excepté la Corse et le pourtour méditerranéen (D). Les données du suivi STOC montrent un très net déclin à l'échelle nationale depuis 1989 (-68 %), au point de conduire à son inscription comme *Vulnérable* sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France (J; U). Espèce fréquentant initialement les bois de conifères ou les saulaies, une colonisation de nouveaux habitats est signalée en Bretagne comme outre-manche au milieu du XX^e s. comme l'île aux Moines dans le Morbihan où 50 couples étaient recensés en 1964 contre 0 en 1957 (G; Mahéo, 1965). Aujourd'hui, le Bouvreuil pivoine reste un nicheur commun en Bretagne, même si la dernière enquête indique une régression à l'est et une diminution des densités de nicheurs avec une possible contraction de la population vers les zones les plus froides et humides de la région (C).

Statut en Côtes-d'Armor

Présent toute l'année dans les Côtes-d'Armor, le Bouvreuil pivoine est une espèce discrète qui fréquente des milieux divers mais ayant en commun des zones buissonnantes. L'espèce est nicheuse sur l'ensemble du département, comme lors de l'enquête précédente (E). Les données indiquent que la période de nidification s'étale principalement entre avril et juillet. Cependant, des cas extrêmes sont notés avec un record de précocité, le 19 mars 1984 (3 juvéniles tout juste volants observés à La Roche-Derrien). A l'inverse, 4 œufs non éclos sont découverts le 22 août 2007 à Peumerit-Quintin.

Les études récentes menées à travers le département montrent que le Bouvreuil pivoine reste encore bien présent et réparti sur certains milieux boisés riches en résineux et lisières comme le massif d'Avaugour-Bois Meur (où l'espèce se situe autour de la 20^e position en abondance et fréquence lors des points d'écoute réalisés en 2013 (GEOCA, 2013). Il est également bien présent et régulier sur l'ensemble du littoral où il semble apprécier les haies buissonnantes qui bordent le sentier littoral. Une



Auteur : Frédéric Guyomard

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

étude à l'échelle des communes de Saint-Brieuc et Plérin montre que l'espèce évite les zones très urbaines et agricoles, se cantonnant aux secteurs les plus riches en boisements et en haies, y compris aux parcs urbains, notamment dans les vallées du Gouët et du Gouédic où l'espèce se reproduit chaque année à Saint-Brieuc (**P**).

En dehors de la période de reproduction, le Bouvreuil pivoine reste globalement sédentaire et de petits regroupements sont signalés même s'ils n'excèdent pas les 10 individus. Des études de radio-tracking réalisées en Angleterre, ont montré que les oiseaux fréquentent le même secteur tant qu'ils y trouvent de quoi se nourrir (fruits, graines, bourgeons), puis partent vers un autre site à plusieurs kilomètres du précédent (**British Birds** « hivernants » p. 404). En migration postnuptiale, quelques dizaines d'individus sont contactés à la Cotentin (Planguenoual) (**T**).

Tendances et perspectives


Après avoir connu une forte progression spatiale et quantitative au milieu du XX^e s., au point que certains arboriculteurs ont tenté de le classer parmi les nuisibles dans les années 1960, le Bouvreuil

pivoine a connu ensuite une régression presque aussi forte. Dans les Côtes-d'Armor où l'espèce était parmi les plus communément observées et capturées dans les années 1970 autour de la forêt de Lorges (**J. Petit, comm. pers.**), aucun secteur n'a encore été abandonné, même si les densités sont parfois assez faibles. Par exemple, 5 couples étaient nicheurs sur Bréhat en 1988 contre 1 seul en 2007. D'autre part, les résultats du comptage de science participative *Oiseaux des jardins* montrent que le Bouvreuil pivoine n'est contacté que dans 10 % des sites suivis alors même qu'il est bien connu et reconnaissable du grand public (**K**). Doit-on considérer que l'espèce retrouve une distribution proche de celle qu'elle occupait avant sa phase d'expansion au XX^e s. ou bien observe-t-on une régression plus globale? Il convient, pour y répondre, de mutualiser les données concernant cette espèce et plus généralement les suivis opérés sur les oiseaux communs (suivis, études, enquêtes) afin de mieux cerner et comprendre les dynamiques de population.

Bibliographie

Mahéo R. (1965). *Nos oiseaux*, 115.

Bouvreuil pivoine Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Frédéric Guyomard

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances.* Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE

