

Bruant lapon

Caladrius lapponicus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Le Bruant lapon est un passereau granivore polytypique qui se reproduit dans les zones arctiques de la toundra scandinave jusqu'au nord du Canada (**D**). En France, il s'agit d'un migrateur et hivernant rare mais régulier, surtout contacté sur le littoral de la mer du Nord et de la Manche (**D**). En Bretagne, l'espèce est régulière en migration de mi-septembre à novembre avec des oiseaux souvent détectés sur le littoral et les îles. En hiver, l'espèce se cantonne à certains secteurs littoraux tels que les herbus de la baie du Mont-Saint-Michel qui demeurent le bastion national mais où les populations sont fluctuantes. L'effectif hivernant national est estimé à 100-150 individus mais peut être bien supérieur en fonction notamment des conditions climatiques qui entraînent des afflux de l'espèce (**D** ; **M**). Le dernier en date qui a touché toute l'Europe de l'Ouest (**Pennington et al., 2012**) a permis de recenser entre 500 et 600 oiseaux en baie du Mont-Saint-Michel (**Provost, 2013**).

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, le Bruant lapon n'a été observé que sur la frange littorale, en migration ou en hivernage. Les premiers individus de passages sont notés à partir de la seconde décennie de septembre puis les données s'étalent jusqu'à début novembre où un pic est atteint. Par la suite, il est intéressant de suivre les sites où l'espèce est présente car un hivernage peut être détecté comme à Treutran (Planguenoual) où l'espèce semble régulière. C'est d'ailleurs sur ces parcelles littorales que le record départemental est atteint le 20 novembre 2010 avec 18 individus comptabilisés.

L'espèce a également été notée en hiver en fond de baie de Saint-Brieuc où sa recherche s'avère plus délicate et hasardeuse : La Cage, Bourienne, Pisse-Oison, Bout de Ville... (Hillion, Langueux). Une recherche ciblée dans les herbus de la Réserve Naturelle permettrait sans doute de détecter plus régulièrement l'espèce. En dehors du fond de

Bruant lapon Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Bruant lapon

Caladrius lapponicus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

baie, l'espèce est notée au passage sur quelques pointes rocheuses, îles ou cordons de galets: cap Fréhel, Bréhat, Sillon de Talbert, Trédrez-Locquémeau, Paimpol, Plouézec, Trélévern, Louannec, Pleumeur-Bodou, Pleudihen-sur-Rance, Pléneuf-Val-André, Saint-Jacut-de-la-Mer. A l'automne, des passages ont été mis en évidence lors des suivis migratoires à la Cotentin (Planguenoual) avec 3 à 4 oiseaux notés chaque année de 2010 à 2013 (T) et 1 individu en migration active également noté à Beg ar Forn (Trédrez-Locquémeau) à l'automne 2013.

Tendances et perspectives

Le statut précis du Bruant lapon reste encore mal cerné en Côtes-d'Armor où de petits contingents doivent hiverner. Sa découverte nécessite une bonne connaissance des cris et une bonne dose de

patience car il faut passer de longs moments à arpenter les chaumes de maïs ou les prés salés pour pouvoir le repérer en hiver. La prospection systématique et régulière des herbus, des labours et des champs littoraux abritant des groupes de passereaux hivernants permettrait sans doute d'affiner les connaissances locales sur sa réelle distribution et régularité.

Bibliographie

Pennington M., Riddington R. & Miles W. (2012). The Lapland Bunting influx in Britain and Ireland in 2010/2011. *British Birds*, 105: 654-673.

Provost S. (2013). Afflux de Bruants lapons *Caladrius lapponicus* en baie du Mont-Saint-Michel en 2010-2011. *Ornithos*, 20(3): 184-187.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.