

Bruant zizi

Emberiza cirulus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce d'Europe méridionale, le Bruant zizi est sédentaire ou migrateur partiel du sud de l'Angleterre jusqu'aux rivages de la mer Noire (Turquie, Asie mineure) et au Maghreb (**D**). En France, il est présent au sud d'une ligne Le Havre/Strasbourg. A l'échelle nationale, les suivis STOC montrent que la population de Bruant zizi se porte bien et connaît même une forte augmentation (+70 % entre 1989 et 2009), sans pour autant étendre son aire de distribution (**J**). En Bretagne, la population nicheuse est répartie de manière homogène sur toute la région sans fluctuation notable, tout au moins à l'échelle du maillage UTM, si ce n'est toutefois le comblement de certains secteurs (**C**). Si cela n'est pas bien mesuré, on constate néanmoins qu'une densification de l'espèce se dessine dans les milieux favorables.



Statut en Côtes-d'Armor

Passereau commun mais parfois discret, le Bruant zizi est présent toute l'année dans le département. Il y fréquente des milieux divers (haies bocagères, vallées boisées, zones périurbaines avec parc et jardins...) présentant globalement les mêmes caractéristiques : des espaces semi-ouverts à proximité de haies arbustives ou buissonnantes.

En période de nidification, le Bruant zizi se rencontre sur tout le département bien que les données enregistrées puissent laisser penser à l'existence de quelques manques intérieurs plus probable-

ment liés à une pression d'observation déséquilibrée qu'à un gradient d'abondance nord/sud tel que celui observé en hiver. En revanche, des études à échelle plus fine montrent que le Bruant zizi colonise désormais l'ensemble des zones favorables et a connu une densification des territoires dans de nombreux secteurs, profitant peut-être du déclin du Bruant jaune. Il est intéressant de signaler au passage que les deux espèces ne partagent souvent pas les mêmes territoires sur de vastes zones géographiques comme la baie du Mont-Saint-Michel ou les marais de Dol dans le département voisin d'Ille-et-Vilaine (**M. Beaufils, comm. pers.**; **Y. Février, comm. pers.**). Plus localement, l'atlas des oiseaux nicheurs Saint-Brieuc/Plérin montre que le Bruant zizi colonise l'ensemble du territoire rural et périurbain en ne délaissant que les zones les plus urbanisées et les secteurs de culture intensive. Il peut alors se révéler un bon indicateur du taux d'urbanisation et de la présence de milieux semi-ouverts à bocagers, occupant par exemple la 16^e place en fréquence IPA sur Plérin contre la 30^e sur Saint-Brieuc (**P**).

En hiver, l'espèce semble délaissier en partie le sud du département au profit de la moitié nord et surtout de la frange littorale où des groupes erratiques sont parfois observés. Ce phénomène de contraction de l'aire de répartition durant l'hiver est dû à la sensibilité marquée de cette espèce pour des températures trop basses et s'observe ailleurs en France et notamment en Normandie (**J**; **H**). On note assez



Bruant zizi

Emberiza cirlus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

peu de rassemblements hivernaux au contraire d'autres fringilles.

Sur l'ensemble des données départementales, seules 23 mentionnent un nombre d'individus supérieur ou égal à 10 avec un maximum de 32 individus le 15 janvier 2004 à Plouguiel et un groupe mixte de 200 bruants (jaune et zizi) le 10 décembre 1989 à Plaintel. Dans beaucoup de cas, les Bruants zizi forment des groupes mixtes avec d'autres fringilles (Bruant jaune, Bruant des roseaux, Linotte mélodieuse...) et fréquentent des zones agricoles semi-ouvertes à la recherche de nourriture. Il est intéressant de noter que, de manière récente, l'espèce devient assez régulière aux mangeoires en hiver d'après les signalements reçus lors des comptages *Oiseaux des jardins* (I). Même s'il est considéré comme sédentaire, quelques individus sont contactés également lors du suivi de la migration postnuptiale à la Cotentin (Planguenoual) (T).

S'agit-il d'individus britanniques ou nordiques cherchant des conditions hivernales plus clémentes ?

Tendances et perspectives

Dans les Côtes-d'Armor, le Bruant zizi est une espèce relativement commune depuis le milieu du XX^e s., même si sa répartition n'est pas homogène. Cependant, des enquêtes plus précises comme celles menées sur Saint-Brieuc/Plérin devraient être conduites dans d'autres secteurs du département pour avoir une connaissance plus pointue des habitats occupés par l'espèce. Les comparaisons de distribution et d'évolution avec le Bruant jaune pourrait aussi révéler des liens étroits tant les deux espèces suivent des dynamiques totalement opposées avec une densification des territoires pour le Bruant zizi et au contraire une rétractation en petits noyaux de population pour le Bruant jaune.



Auteur : Frédéric Guyomard

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances.* Saint-Brieuc, 416 p.

