

Busard cendré

Circus pygargus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

Le Busard cendré, espèce monotypique, est un nicheur peu commun à travers l'Europe, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale; migrateur, ses quartiers d'hiver se situent en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud (**B**; **D**). Les populations européennes, estimées à 65 000 couples dans les années 2000, représentent plus de la moitié de la population mondiale et le statut de l'espèce y est jugé favorable, la majeure partie des pays qui connaissent une stabilité ou une croissance compensant la baisse des effectifs connus ailleurs (Portugal et Suède) (**B**). La France, où l'espèce est inscrite comme *Vulnérable* sur la Liste Rouge des espèces menacées, compte 4 000 à 5 000 couples nicheurs dans les années 2000, chiffre apparemment stable depuis 1990 mais qui masque les tendances très variées localement (**D**; **U**; **TH**). La population bretonne a ainsi décliné depuis le début du XX^e s. pour atteindre 20 à 30 couples lors de la dernière enquête régionale, soit la moitié des effectifs de 1980-1985 (**C**; **G**).

Statut en Côtes-d'Armor

Occupant les landes de la Poterie (Lamballe) en 1970 et 1971 (2 couples), nicheur à Lanfains de 1971 à 1973 (**J. Petit, comm. pers.**) et encore présent à Locarn jusque 1992 (5 couples en 1979, 2 en 1983) (**Bourdon, 1999**), les dernières preuves de reproduction départementales du Busard cendré remontent à 2001 sur le site de Minez Cliguéric (Plévin) avec 2 juvéniles observés le 4 août. Ce dernier site (dénommé landes de Tréogan par certains observateurs) a fait l'objet de suivis réguliers avec des jeunes notés en 1987, 1991, 1999 et 2001. Ces mentions constituent la totalité des indices certains de reproduction présents dans la base de données mise en place dans les années 1980. Depuis l'année 2002 et son dernier indice de reproduction probable à Plévin (1 couple le 11 mai), les rares mentions de l'espèce dans le département (2014 compris) concernent des oiseaux de passage aux époques habituelles de migration pré-nuptiale (4 données du 14 avril au 29 mai) et post-nuptiale (2 données les

Busard cendré Nidification (2004-2012)



Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Busard cendré

Circus pygargus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

28 juillet et 26 août). L'indice certain de reproduction figuré pour la période 2004-2012 concerne le Morbihan et l'espèce, autrefois nicheuse rare dans le département, doit être aujourd'hui uniquement considérée comme migratrice rare.

Tendances et perspectives

C'est pour des raisons probablement mêlées (perte d'habitat par enrésinement, mise en culture, attractivité en proies...) que le Busard cendré a quitté progressivement, au cours du XX^e s., ses habitats traditionnels de landes et marais humides pour privilégier les plaines agricoles de l'Hexagone (**D** ; **G**). L'abandon des landes fût relevé début des années 1970 (Lamballe et Lanfains), début 1990 (Locarn) et début 2000 (Plévin) dans le département mais sans une implantation de l'espèce en zones cultivées pour autant. Une grande partie de ces zones potentielles (région de Loudéac, Collinée, Broons...), proches du département de l'Ille-et-Vilaine où une population nicheuse dans les cultures a été découverte récem-

ment (**C**), ne fait l'objet d'aucune recherche faute d'observateurs locaux. Le Busard Saint-Martin subsiste dorénavant seul (de manière tout aussi fragile) dans les milieux naturels potentiels du département (landes de Locarn, Plévin) et à moins de découvrir une population en milieu agricole dans le quart sud-est, il y a peu de chance de compter de nouveau le Busard cendré parmi les espèces nicheuses des Côtes-d'Armor. Cette éventualité semble dépendre d'une part de la santé des populations du grand Ouest (Poitou-Charentes, Vendée, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine), fragiles du fait de l'intensification des pratiques agricoles; d'autre part des conditions d'hivernage en Afrique, toujours délicates au regard des luttes antiacridiennes en cours (**B** ; **D**).

Bibliographie

Bourdon P. (1999). Suivi de la nidification du Busard Saint-Martin et cendré sur les landes du secteur sud-ouest du massif granitique de Quintin. *Le Fou*, 48: 18-27.

Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

