

# Cigogne noire

*Ciconia nigra*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Espèce monotypique, la Cigogne noire se reproduit principalement dans les régions tempérées et boréales chaudes d'Europe et d'Asie et hiverne en Afrique de l'Ouest (X). En France, il s'agit d'un nicheur très rare mais en augmentation et d'un migrateur peu commun. L'espèce n'est pas présente en hiver (D). En Bretagne, elle n'est observée qu'en migration.

## Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Cigogne noire est régulièrement observée en migration postnuptiale, principalement sur les côtes, notamment en baie de Saint-Brieuc et dans le Trégor-Goëlo. Dans une moindre mesure, des observations sont faites autour de l'estuaire de la Rance. Quelques données intérieures sont signalées : Keraël (Plouaret), landes de Locarn, étang des Salles (Perret), Quintin, bois de Colizan (Langast), la Ville Halio (Plourhan), Plélo, Saint-Barthélémy (La Méaugon), Vauverte et la rivière l'Evron (Pommeret). La plus ancienne donnée concerne 1 individu observé le 1<sup>er</sup> juillet 1970 à Saint-Jacut-de-la-Mer. Les observations s'étalent de mai à septembre, la plus précoce datant du

23 mai 1991 où 1 individu a été vu aux landes de Locarn et la plus tardive datant du 21 septembre 2014 avec 1 ind. observés dans le polder de Plou-balay. Leur séjour est en général bref (1 à 3 jours), à l'exception d'1 individu resté 8 jours à Pisse-Oison (Hillion) du 8 au 15 septembre 1997. Il avait été rejoint par un second individu le 13 septembre. La majorité des observations sont effectuées durant les 3 dernières semaines d'août, ce qui correspond à la chronologie de passage enregistrée en France (Bentz, 2006). Le plus gros groupe observé comprenait 11 individus volant au dessus du cimetière de Plestin-les-Grèves le 9 août 2010.

Sur 101 individus contactés au total, 17 ont été identifiés comme étant des juvéniles. Des oiseaux échappés peuvent être observés comme ce fut le cas le 6 mai 2013 au port Grisseau (Trélivan) où 2 individus porteurs de balises provenaient du château de la Bourbansais (Ille-et-Vilaine) et ont passé la nuit sur un toit (données Ouest-France, 2013). A noter, en 2006, un passage exceptionnel de l'espèce dans le département (principalement dans le Trégor) avec 17 données collectées pour 25 oiseaux (contre une moyenne de 2 données par an



Auteur : Sandy Garandeau

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



# Cigogne noire

*Ciconia nigra*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

sur les 20 années précédentes) entre le 29 juillet (1 immature en baie de la Fresnaye) et le 4 septembre (1 juvénile à Noyal). L'année 2014 a aussi vu un transit important de l'espèce (au moins 15 données signalées).

## Tendances et perspectives

Nicheuse relativement récente en France et y restant rare, la Cigogne noire est logiquement classée *En Danger* sur la Liste Rouge nationale des nicheurs mais également *Vulnérable* en migration (U). Elle est également inscrite à l'Annexe I de la

Directive Oiseaux et mérite donc une attention particulière quant aux sites fréquentés et aux effectifs départementaux. Même si les effectifs migratoires sont faibles en Côtes-d'Armor, il est intéressant de prendre en compte l'espèce dans la gestion et la protection de certaines zones humides, estuaires ou étangs.

## Bibliographie

**Bentz G. (2006).** Important passage de Cigogne noire *Ciconia nigra* en été 2006. *Le Fou*, 70: 3-6.

Auteur : Sandy Garandeau

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

