

# Corneille mantelée

*Corvus cornix*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

La Corneille mantelée se reproduit à la fois dans le nord de l'Europe (Irlande, Ecosse, Féroé, Danemark, Scandinavie) et sur le pourtour méditerranéen, de la Corse à l'Egypte et au Moyen-Orient (D). En France, l'espèce est commune en toute période en Corse uniquement et désormais rare sur le continent (D). L'espèce semblait pourtant commune avant son déclin au début du XX<sup>e</sup> s. et Mayaud la signalait encore « *répandue le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique...* » en 1936. La population hivernante nationale serait passée d'un millier d'individus en 1953-1955 à moins de 500, 10 ans plus tard puis à une centaine en 1979-1980 (Y). Régulièrement présente dans les deux tiers nord du pays, on pouvait l'observer jusqu'en Bretagne lors d'hiver particulièrement rigoureux (en 1947 notamment) et l'espèce aurait encore séjourné de 1993 à 1995 à Concarneau (Finistère). En Bretagne, l'espèce a même niché occasionnellement en 1818 et avant 1911 et des couples mixtes avec la Corneille noire (parfois reproducteurs) ont été notés occasionnellement dans les années 1970 jusqu'à Ouessant (D). En Côtes-d'Armor, 1 individu a été présent du 5 juillet au 20 août 1970 en baie de la Fresnaye. Puis en 1974 et 1994, l'espèce a été contactée aussi bien au printemps (février à avril) qu'à l'automne (novembre) toujours sur le littoral (cap Fréhel (Plévenon), anse d'Yffiniac (Hillion), plage de Tournemine (Plérin), plage de Saint-Maurice (Morieux), baie de Saint-Brieuc. Seule 1 observation a été réalisée à l'intérieur des terres dans le même période : 1 en lisière de la forêt de Lorge à L'Hermitage-Lorge le 24 janvier 1975.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

