

Cygne tuberculé

Cygnus olor



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique plutôt originaire d'Asie, le Cygne tuberculé est désormais répandu en Europe et en Asie et introduit dans de nombreuses autres régions du monde (**D**). Autrefois accidentel en France, le Cygne tuberculé a connu une spectaculaire expansion géographique et démographique depuis 1970 à la suite de lâchers et de la sédentarisation des nombreux hivernants (**D**). Actuellement, il est considéré comme un nicheur peu commun mais bien réparti dans la moitié nord-est de la France, et un hivernant commun (**D**). En Bretagne, l'expansion des nicheurs a été très nette entre les années 1970-1980 et 2000, passant de 3 mailles indicées à une cinquantaine entre les deux dernières enquêtes régionales (**C**). L'espèce est désormais bien implantée et sédentaire sur l'ensemble des marais côtiers du sud-Bretagne et d'une partie du Finistère mais reste bien plus localisée dans l'intérieur des terres et sur le littoral nord (**C**).

Statut en Côtes-d'Armor



Le Cygne tuberculé est un oiseau sédentaire peu commun et localisé en Côtes-d'Armor. Il colonise actuellement surtout les marais littoraux, étangs et divers bassins du Trégor où les couples sont le plus souvent isolés. Il se reproduit également dans l'intérieur des terres à l'étang du Pas (Lanfains) et à Plessix-Balisson. En hiver, les oiseaux sont présents globalement sur les mêmes secteurs avec quelques mouvements et échanges entre divers étangs. Il faut toutefois souligner que certains ob-

servateurs ne notent pas systématiquement les rencontres avec cet oiseau, souvent considéré comme un échappé.

On peut donc parier que la distribution et les effectifs de l'espèce sont quelque peu sous-estimés dans le département. Les oiseaux fréquentent assez peu le littoral même si c'est là que sont notés les principaux groupes observés comme les 17 individus notés le 11 juin 2011 à Bourienne (Langueux) ou, plus exceptionnel, les 33 individus contactés sur les bords de Rance en janvier 1963 (hiver très rigoureux), qui rappellent qu'autrefois l'espèce connaissait des afflux hivernaux à l'instar des autres espèces de cygnes. Plus généralement, les observations correspondent à des groupes familiaux de quelques individus.

Tendances et perspectives

Au cours des dernières années, le Cygne tuberculé a connu une lente progression dans le département avec un bastion désormais bien identifié sur le littoral du Trégor. Son statut de conservation favorable en Europe et en France (**B ; U**) devrait lui permettre de prolonger cette dynamique. Ceci d'autant plus que le Cygne tuberculé s'adapte bien à des pièces d'eau de petite taille et très artificialisées telles que les stations de lagunage, les étangs artificiels... Les zones potentiellement favorables sont donc encore nombreuses.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.