

Eider à duvet

Somateria mollissima



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A



Polytypique, l'Eider à duvet est une espèce holarctique à large distribution mondiale. Il est représenté en Atlantique Nord par la sous-espèce type qui se reproduit de l'Islande au nord-ouest de la Russie en passant par les îles Britanniques et la France (B ; C). En France, il s'agit désormais d'un nicheur occasionnel (quelques couples nichant ponctuellement) et d'un migrateur et hivernant peu commun (D). La population nicheuse nationale n'a jamais excédé 25 couples à la fin des années 1990, répartis sur la façade atlantique du Morbihan jusqu'au banc d'Arguin et les effectifs très fluctuants à la mi-janvier atteignent en moyenne 2240 ind. sur la période 1997-2006, principalement distribués en Normandie et en Manche-est (D). En Bretagne, l'Eider à duvet se reproduit de longue date mais de façon sporadique et localisée (C). Il hiverne en petits effectifs sur le littoral.

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, l'Eider à duvet peut être considéré comme un nicheur occasionnel et un migrateur et hivernant localisé fournissant tout de même plus de 600 données en moins de 30 ans. Durant la dernière enquête nicheuse, seul l'archipel des Sept-Iles (île Plate) a fourni des indices de reproduction et notamment une nidification certaine en 2008 et 2009 (nids et coquilles d'œufs). En 2010, une femelle était à nouveau présente sur le même secteur. Par le passé, des indices de nidification ont été obtenus sur divers îlots marins du département. Dans l'archipel de Modez (îlots des Tusques), les reproductions constatées en 1974 et 1975 consti-

tuent les seules données de l'atlas 1970-1975 en Bretagne (G). L'îlot du Verdelet (Pléneuf-Val-André) a fourni des indices de nidification possibles entre les années 1960 et les années 1980 (A ; E). L'île à Bois dans l'estuaire du Trieux a ensuite accueilli une reproduction certaine (nid avec œufs) en 1988 (E). Enfin, une reproduction probable est notée sur l'île Blanche (archipel de Saint-Riom) en 2001.

En hivernage, l'Eider à duvet connaît de grosses fluctuations à l'image des autres sites français. Sur la période 2000-2009, la moyenne départementale à la mi-janvier est d'environ 20 ind., ce qui constitue presque la moitié des effectifs régionaux (W). Ils se répartissent essentiellement en fond de baie de Saint-Brieuc (15 oiseaux en moyenne) où ils accompagnent généralement les importants contingents de Macreuse noire visibles entre Hillion et Pléneuf-Val-André. Des oiseaux sont également signalés en baies de la Fresnaye et Saint-Jacut notamment depuis Saint-Cast-le-Guildo (4 ind. en moyenne à la mi-janvier), également en compagnie de Macreuse noire. Des oiseaux isolés ou en petits groupes sont également régulièrement notés dans le Trégor (surtout de l'estuaire du Jaudy au Sillon de Talbert). Il est intéressant de constater l'évolution récente de l'hivernage en Côtes-d'Armor. Ainsi, le site d'observation le plus régulier du département (la pointe des Guettes à Hillion) a vu de fortes variations entre les années 1980 (jusqu'à 50 en mars 1989), les années 1990 (jusqu'à 200 le 31 décembre 1995), les années 2000 (maximum de 77 le 22 décembre 2002) et enfin les années 2010 (maximum de 27 le 9 janvier).



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Eider à duvet

Somateria mollissima



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Dans les années 1980 et 1990, des observations de plusieurs dizaines d'oiseaux ne sont pas exceptionnelles en dehors de la baie de Saint-Brieuc avec régulièrement 20 à 50 ind. à Saint-Jacut-de-la-Mer mais aussi 84 à l'île Grande (Pleumeur-Bodou), le 29 octobre 1995, 50 à Erquy le 14 décembre 1996, 45 à Trestel (Trévou-Tréguignec) en novembre 1997, 35 à la pointe de Minard (Plouézec) le 14 décembre 1996...

En Côtes-d'Armor et à l'exception des données de reproduction, l'Eider à duvet est surtout observé de novembre à mars, bien que des migrateurs et estivants soient régulièrement notés de juillet à octobre.

Tendances et perspectives

L'Eider à duvet est plutôt en progression à l'échelle européenne (**B**) mais son statut nicheur en France

le classe comme une espèce en *Danger Critique d'extinction (U)*. La petite population reproductrice a ainsi totalement disparu en 2000 suite à la marée noire de l'Erika. La réapparition de quelques couples nicheurs en Bretagne et d'une remontée des estivants peut laisser espérer de nouvelles tentatives de reproduction dans le département. Les effectifs hivernants n'offrent pas de réelle tendance à court ou moyen terme. Sa présence sur les mêmes secteurs que la Macreuse noire, et notamment à proximité des concessions mytilicoles, devrait être prise en compte et peut être mieux cernée du fait des dérangements ciblés (tirs, chasse...) qui touchent cette dernière.

