

# Engoulevent d'Europe

*Caprimulgus europaeus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


L'Engoulevent d'Europe est une espèce polytypique qui niche dans l'ensemble de l'Europe et du nord de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient à l'exception du nord des pays scandinaves et hiverne en Afrique (**D**). La population européenne est estimée entre 470 000 et 1 million de couples et la population française compte 50 000 à 100 000 couples (**D**). Son mode de vie est essentiellement crépusculaire et nocturne. Il occupe des habitats ouverts comme les landes et les clairières, où il niche à même le sol. A la tombée de la nuit, il est aisé de détecter sa présence tant son chant est caractéristique. Néanmoins, son mode de vie ainsi que ses habitats de prédilection n'ont rien pour le servir puisqu'il est victime des changements de pratiques sylvicoles et de la disparition de son habitat. De ce fait, ses populations sont en baisse d'effectifs mais aucun suivi ne permet de quantifier réellement ce déclin.

## Statut en Côtes-d'Armor

A l'échelle du département, la répartition de l'Engoulevent d'Europe est très morcelée. Les sites de nidification occupés sont de manière générale connus, même s'il doit être plus présent qu'on ne le pense, l'espèce étant peu prospectée. Les

principaux sites occupés concernent la plupart du temps des zones de landes ouvertes présentes le long du littoral (Fréhel, Erquy, Plourivo, ouest-Trégor), des landes résiduelles situées aux sommets des reliefs intérieurs (cimes de Kerchouan) ou des forêts en gestion permettant l'ouverture du milieu par des coupes rases et donc fournissant un habitat favorable pour l'espèce (Bois Meur, Lorge ...). Quelques sites témoins bénéficient de suivis réguliers permettant d'évaluer le nombre d'individus chanteurs et leur évolution. C'est le cas du massif de Penhoat-Lancerf (Plourivo) où le premier suivi a été effectué en 1990 (**Le Roy, 1990**). Il abrite entre 10 et 16 couples nicheurs avec une relative stabilité malgré une légère baisse des effectifs dans les années 2000 (**Gosselin, 2008**). Les comptages ne concernent que peu de sites. Les densités de chanteurs peuvent être différentes en fonction des secteurs. Les landes de Locarn comptaient, en 2009, une densité de 0,1 chanteur à l'hectare alors que le massif de Plourivo compte une densité moyenne de 0,04 chanteur à l'hectare (**Nedellec & Le Mener, 2009**). De fortes densités sont en revanche obtenues sur de petites zones littorales très favorables comme au cap d'Erquy. Ces densités correspondent à d'autres résultats régionaux (**C**).

Engoulevent d'Europe Nidification (2004-2012)



Auteur : Sébastien Théof  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE



# Engoulevent d'Europe

*Caprimulgus europaeus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Les premiers chants peuvent être entendus dans la dernière décade du mois d'avril (record au 25 avril 2010) mais plus généralement en mai et juin et les derniers chanteurs sont audibles jusqu'à la seconde décade d'août. L'espèce peut être observée jusqu'en septembre avec une dernière donnée le 1<sup>er</sup> octobre 1994 (1 ind. trouvé mort sur l'île Bono dans l'archipel des Sept-Iles).

## Tendances et perspectives

L'Engoulevent d'Europe présente un statut de conservation défavorable en Europe et a régressé localement en France au cours des dernières décennies (**B** ; **C**). Inscrit à l'Annexe I de la Directive Oiseaux, classé en SPEC 2 à l'échelon européen et inscrit comme espèce déterminante ZNIEFF (**B** ; **R**), l'Engoulevent d'Europe doit faire l'objet d'une surveillance accrue et d'éventuels moyens locaux de conservation ou de protection. La disparition de son habitat liée aux changements des pratiques

culturelles et sylvicoles a entraîné une chute des populations. A l'heure actuelle, même si les effectifs semblent stables (**C**), il convient de conserver au maximum son habitat et de favoriser son installation sur d'autres secteurs en appliquant des mesures de gestion sur les sites potentiellement favorables tels que les landes et les massifs forestiers.

## Bibliographie

**Le Roy R. (1990).** Note sur l'Engoulevent dans les landes de Plourivo. *Le Fou*, 24: 13-17.

**Nedellec S. & Le Mener R. (2009).** Comptage d'Engoulevent aux landes de Locarn le 15 juin 2009. *Le Fou*, 79: 19-21.

**Gosselin L. (2008).** Comptage d'Engoulevent d'Europe sur le massif de Penhoat-Lancerf à Plourivo. *Le Fou*, 74: 11 -12.

Auteur : Sébastien Théof

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

