

Fuligule à bec cerclé

Aythya collaris



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Fuligule à bec cerclé niche en Amérique du Nord, de la Colombie britannique à Terre-Neuve (**D**). L'espèce s'égaré régulièrement en Europe de l'Ouest. En France, 13 oiseaux ont été vus en moyenne par an entre 2001 et 2007 (**M**). La Bretagne est particulièrement concernée et certaines mentions font état de plusieurs oiseaux. En Côtes-d'Armor, 4 sites ont accueilli l'espèce: 1 mâle en plumage nuptial arrivé le 28 avril 1999 semble s'apparier avec une femelle de Fuligule morillon sur l'étang de Gourveaux (Saint-Gilles-Vieux-Marché) et restera au moins jusqu'au 15 janvier 2000, 2 mâles le 3 février 2006 sur le lac de Guerlédan (Mûr-de-Bretagne), 1 femelle du 31 janvier au 5 février 2009 sur l'étang de Quélenec, 1 femelle (probablement celle de Quélenec) sur l'étang de Saint-Connan du 6 mars 2009 au 18 avril 2009. A partir de 2012, des individus sont aussi régulièrement observés sur des pièces d'eau proches de la baie de Saint-Brieuc mais pourraient correspondre à des individus échappés. Plusieurs oiseaux sont également notés en novembre 2012 sur l'étang de Gourveaux.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

