

Fuligule milouinan

Aythya fuligula



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, le Fuligule milouinan se reproduit au delà du 60°N. La sous-espèce nominale occupe le nord de l'Eurasie et l'Islande (**D**). En France, il s'agit d'un migrateur et hivernant peu commun (1630 oiseaux en moyenne à la mi-janvier sur la période 1997-2006) qui fréquente surtout les rivages abrités, les estuaires et quelques plans d'eau intérieurs (**D**). L'estuaire de Vilaine est le principal site d'hivernage français qui regroupe en moyenne 72 % des effectifs. Le reste de la Bretagne accueille seulement des petits groupes d'oiseaux sur le littoral mais les effectifs et sites fréquentés augmentent lors de vagues de froid.

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, le Fuligule milouinan est un migrateur et hivernant rare. Les 2 sites les plus fréquentés sont ceux offrant des données pour l'enquête hivernale 2009-2013 à savoir le fond de la baie de Saint-Brieuc et l'estuaire de la Rance. Sur cette période, les effectifs sont toutefois très réduits avec 1 à 3 oiseaux maximum notés depuis 2009 dans le département. En hivernage, l'espèce s'est considérablement raréfiée depuis les années 1980.

Sur l'estuaire de la Rance, les effectifs ont atteint jusqu'à 51 ind. le 3 mars 1985, 18 le 10 février 1986, 15 le 3 mars 1987, 59 le 15 janvier 1989 pour ensuite se réduire à moins de 10 oiseaux avant de ne plus être enregistrés chaque année. En baie de Saint-Brieuc, le constat est identique : 17 le 8 février 1987, 30 le 20 février 1991, 17 le 17 décembre

1995 puis des effectifs ensuite de quelques oiseaux notés irrégulièrement.


D'autres sites fournissent ponctuellement des données : Louannec, la baie de Lannion, les estuaires et baies du Trégor et du Goëlo, Perros-Guirec.

Dans l'intérieur des terres, les données se sont également réduites au fil des ans : 4 à l'étang Neuf (Saint-Connan) le 23 janvier 1987, 1 à l'étang des Salles (Perret) le 14 janvier 1988, 1 à Lanrelas le 22 janvier 1989, 1 du 1^{er} au 5 juin 1994 sur l'étang du Moulin Neuf (Plounérin), 2 sur l'étang de Bosméleac du 12 février au 17 mars 1996, 1 à l'étang de Beffou (Plougras) le 17 janvier 2008.

Hormis 1 donnée en octobre, 1 en avril et 2 en juin, toutes les données s'étalent de novembre à mars avec un pic au cœur de l'hiver.

Tendances et perspectives

Considéré *En Danger* à l'échelle européenne du fait d'un large déclin (**B**) et comme hivernant *Quasi menacé* en France (**U**), le Fuligule milouinan a vu ses effectifs se réduire au cours des dernières années avec malgré tout d'importantes fluctuations interannuelles. La baisse globale des effectifs à plus large échelle a sans doute contribué à sa raréfaction en Côtes-d'Armor. A l'heure actuelle, le département ne revêt pas d'importance pour les populations hivernantes mais demeure une zone potentielle d'hivernage pour de petits contingents en cas de vague de froid.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.