

Goéland à ailes blanches

Larus glaucoides



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Goéland à ailes blanches est une espèce polytypique qui se reproduit dans l'Arctique canadien et au Groenland (O; Y). Les populations nichant dans le nord-ouest du Québec et le sud de l'île de Baffin sont considérées comme des hybrides stables entre le Goéland de Thayer (*L. thayeri*) à l'ouest et la sous-espèce nominale du Goéland à ailes blanches (*L. glaucoides glaucoides*) à l'est : ces hybrides sont nommés Goéland de Kumlien (*L. glaucoides kumlieni*) (O). Hivernant le long de l'Atlantique Nord, la présence hivernale du Goéland à ailes blanches est rare en France en dehors d'invasions exceptionnelles. Ce fut notamment le cas en 1984 (40 mentions homologuées) et surtout en 2009 suite à 2 tempêtes et l'observation de 141 oiseaux différents (dont 11 de la sous-espèce *kumlieni*) (Dubois & Duquet, 2009). Depuis le 1^{er} janvier 2013, l'espèce (hors sous-espèce *kumlieni*) ne fait plus partie de la liste des espèces soumises à homologation nationale.

En Côtes-d'Armor, 11 des 14 données disponibles sont homologuées et concernent toutes des oiseaux de 1^{er} hiver observés à l'unité :

- le 24 février 1994 à Erquy (1^{ère} mention départementale de l'espèce)
- le 31 janvier 1998 à Port Lazo (Plouézec)
- du 23 février au 9 mars 1998 en baie de Saint-Brieuc
- le 25 janvier 2000 sur l'étang de Loudéac
- le 14 février 2000 à Callac
- le 20 mars 2000 à Plestin-les-Grèves
- un cadavre (aile entière) est découvert au Sillon de Talbert (Pleubian) le 13 janvier 2007
- les 27 et 28 janvier 2008 à Pleumeur-Bodou
- du 3 janvier au 22 février 2009 sur la station de lagunage de Pleudaniel
- le 26 mai 2013 à Ménez Crao (Plévin) dans un groupe de 500 Goélants bruns et argentés
- le 3 mai 2014 au Toëno (Trébeurden).

L'espèce est désormais d'observation assez régulière sur le littoral breton courant janvier/février, notamment lors d'invasions probablement en lien avec des conditions météorologiques particulières, mais il demeure nécessaire d'être vigilant et rigoureux sur son identification eu égard à la présence hivernale du Goéland bourgmestre et de Goélants argentés leuciques notamment (O; Y).

Bibliographie

Dubois P.J. & Duquet M. (2009). Joris, Klaus et la mouette blanche. Les tempêtes de Janvier 2009 en France. *Ornithos*, 16-2. 81-89.

Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

