

Goéland leucophée

Larus michahellis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

Le Goéland leucophée a longtemps été considéré comme une sous-espèce du Goéland argenté dont il est proche. Il niche sur le pourtour méditerranéen, la côte ouest de la mer Noire, sur le littoral atlantique, du Maroc au sud de la Bretagne et ponctuellement dans les terres le long des fleuves jusqu'au sud de la mer du Nord (D). Sa population totale est estimée de 210 000 à 256 000 couples à la fin des années 1990 (C). En 2009-2012, un minimum de 33 000 à 35 000 couples a été recensé en France (recensement partiel), essentiellement sur le littoral méditerranéen qui accueille 97 % des effectifs français (CA). En Bretagne, la reproduction est anecdotique et ne représente que 4 couples enregistrés dans le Morbihan lors de ce dernier recensement.

La nidification n'a jamais été relevée en Côtes-d'Armor. Depuis 1978, une centaine de données est disponible et concerne des oiseaux observés généralement à l'unité dans des groupes plurispécifiques (goélands et mouettes) durant la période internuptiale (juillet à septembre) ou en hiver (décembre et janvier). Ces observations réalisées aussi bien sur

le littoral que dans les terres correspondent à des oiseaux nichant en Méditerranée et se dispersant après la reproduction vers les côtes de la Manche et de l'Atlantique en suivant les grands fleuves (Q). Le spectre alimentaire de cette espèce est très large et ressemble à celui du Goéland argenté : animaux marins et terrestres, déchets... En Côtes-d'Armor, les observations ont lieu essentiellement sur le littoral, notamment sur la commune de Langueux (42 des 100 observations enregistrées), sur la partie est de la baie (communes de Plérin, Pléneuf-Val-André) et dans l'ouest Trégor. Cela correspond sans doute plus à un effort de prospection et d'identification des Laridés qu'à une réelle répartition comme telle. Le Goéland leucophée n'est pas une espèce menacée, ni dans son aire de répartition, ni en France (C). Sa reproduction en Bretagne, bien que pouvant passer facilement inaperçue dans des colonies plurispécifiques de grands goélands, reste anecdotique. En Côtes-d'Armor, sa présence internuptiale restera probablement régulière mais en faible nombre.

Goéland leucophé Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Alexis Chevallier
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

