

# Grive draine

*Turdus viscivorus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


Espèce polytypique très commune, la Grive draine se répartit largement de l'Afrique du Nord à l'Asie en passant par toute l'Europe où elle peut être sédentaire (dans la partie sud et ouest) ou migratrice partielle. En France, c'est une nicheuse commune, estimée entre 100 000 et 300 000 couples dans les années 2000 (D). En Bretagne, où elle peut être observée toute l'année, elle affectionne particulièrement les espaces boisés (forêts, bocages, bosquets, vergers...). Si l'espèce semble y être sédentaire, des individus erratiques et migrateurs sont néanmoins signalés (C ; Y).

## Statut en Côtes-d'Armor

La Grive draine est répandue sur l'ensemble des Côtes-d'Armor. Les indices de reproduction certaine sont nombreux car, au même titre que la Grive musicienne et le Merle noir, les adultes reproducteurs qui transportent la nourriture pour les jeunes sont très visibles, de même que les familles fraîchement envolées. Elle fréquente alors une grande diversité d'habitats boisés : forêts, lisières, bocage, jardins,

ripisylves, peupleraies, vergers... D'après les données départementales, la Grive draine chante surtout du mois de décembre jusqu'à juillet. Cette précocité du chant est liée à une reproduction dès le mois de février. Son chant puissant porte à distance et permet de bien repérer les nicheurs potentiels en période hivernale. Surtout étudiée en milieu forestier, l'espèce peut y atteindre des densités assez importantes. En période de nidification, elle semble éviter les zones urbaines trop denses comme cela a été constaté en 2012 à Saint-Brieuc (P).

En période hivernale, la répartition de la Grive draine est également homogène. L'espèce occupe alors les mêmes habitats et se réunit en petits groupes n'excédant que rarement la vingtaine d'individus. Peu fréquente dans les jardins en hiver et peu abondante d'après l'opération de comptage *Oiseaux des jardins* (K), des individus sont en revanche nettement plus contactés dans les champs d'après les recensements hivernaux (SHOC) où la Grive draine est présente dans plus de 10 % des sites échantillonnés en France (MNHN).



Auteur : Sébastien Théof  
Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances.* Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE



# Grive draine

*Turdus viscivorus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

Des migrateurs en provenance des pays plus nordiques viennent compléter les effectifs sédentaires costarmoricains à la mauvaise saison, et quelques observations de migration active existent à l'automne. Néanmoins cela ne représente que de faibles effectifs. Ainsi, moins de 30 oiseaux ont été enregistrés en 2011 et 2012 sur le site de la Cotentin à Planguenoual (T) et moins de 300 individus sont habituellement notés sur le site de Carolles en Normandie ([www.migraction.net](http://www.migraction.net)). Ces individus proviendraient majoritairement de sites britanniques, du nord et du centre de l'Europe (D).

## Tendances et perspectives

Bien que chassable, la Grive draine ne semble pas être menacée et l'espèce ne bénéficie pas de statut de protection particulier tant les effectifs globaux sont encore forts. Qualifiés comme stables à l'échelle internationale, ses effectifs semblent toutefois subir une régression en France depuis 20 ans avec une perte d'environ un tiers (B ; J). Dépendante des milieux boisés, la cause de cette baisse pourrait être attribuée à la modification des paysages et en particulier au déboisement et à l'artificialisation.

**Grive draine Répartition hivernale (2009-2013)**



Auteur : Sébastien Théof  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE

