

Guifette noire

Chlidonias niger



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Guifette noire niche de l'Europe à l'Asie et hiverne en Afrique. La population européenne est en déclin modéré depuis les années 1970 et compte 83000 à 170000 couples (**B**). En France, il s'agit d'une nicheuse rare (140 à 415 couples dans les années 2000) mais d'une migratrice commune (**D**). L'espèce ne niche pas en Bretagne mais la principale population nationale est située en Loire-Atlantique. Elle peut être observée en migration sur l'ensemble du littoral et les zones humides intérieures.


Statut en Côtes-d'Armor

La Guifette noire est une espèce migratrice commune en Côtes-d'Armor, principalement observée sur le littoral mais aussi plus ponctuellement sur de nombreux étangs. La migration pré-nuptiale est peu notée (1 % des données en avril et 4 % en juin). Le passage post-nuptiale démarre dès le mois de juillet (5 % des données) puis culmine en août (33 %) et septembre (50 %) avant de se réduire en octobre (7 %). La migration post-nuptiale peut être assez marquée avec des groupes conséquents et un certain renouvellement sur les sites de stationnement comme sur les sites de guet à la mer. Des regroupements importants en pêcheries sont notés sur le littoral durant la migration post-nuptiale : 300 à la Grève des Courses (Langueux) le 28 août 2012,

280 à la Cage (Langueux) le 11 août 1999, 200 à la plage des Rosaires (Plérin) le 7 septembre 2011... Les prospections maritimes permettent aussi de contacter des oiseaux en migration active en mer et sans savoir précisément quels effectifs transitent régulièrement par les Côtes-d'Armor lors de la migration, plusieurs centaines d'oiseaux semblent concernés. Le fond de baie est un site privilégié d'observation à la fin de l'été, à la fois lors des phases d'alimentation (pêcheries souvent mixtes avec des sternes et Laridés) mais aussi en reposoir avec d'autres Sternidés. Plus dans l'intérieur des terres, les 2 sites de passage les plus réguliers sont l'étang du Moulin Neuf (jusqu'à 6 oiseaux le 23 septembre 1993 et le 15 septembre 1995) et la plaine de Taden (jusqu'à 10 le 3 septembre 1997).

Tendances et perspectives

La Guifette noire connaît un déclin modéré en Europe (**B**) et est classée *Vulnérable* comme nicheuse en France (**U**). Cependant, les populations qui transitent en Côtes-d'Armor proviennent probablement du nord et de l'est de l'Europe où la situation est moins sensible (**B**). L'irrégularité des suivis et des passages pour cette espèce susceptible de transiter au large des côtes permet difficilement de déduire une tendance locale.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

