

Guillemot de Brünnich

Uria lomvia



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Guillemot de Brünnich se reproduit au Canada, Groenland, Islande, Spitzberg et au nord de la Scandinavie avant d'hiverner le long des côtes des mers arctiques et au nord de l'océan Atlantique (Y). En France, il s'agit d'un migrateur et hivernant occasionnel très rarement observé le long des côtes (D). Seules 3 données sont parvenues au CHN entre 1978 et 2003 (2 en Finistère, 1 dans le Pas-de-Calais) faisant toutes suite à des marées noires mais certaines n'ont vraisemblablement pas été soumises à homologation (O).

En Côtes-d'Armor, 1 individu a été retrouvé mort mazouté le 4 avril 1978, suite à la marée noire de l'Amoco Cadiz et rapporté au centre de soins de Port-Blanc (Penvénan). A noter que l'hiver 2014 a fourni une nouvelle donnée pour l'espèce en France avec un individu mazouté rapporté le 15 février au centre de soins de l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou), sans information précise mais qui aurait été récupéré sur le littoral du Finistère Sud.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

