

# Harelde boréale

*Clangula hyemalis*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, l'Harelde boréale est un nicheur circumboréal essentiellement réparti au delà du 65°N en Europe (D). En France, il s'agit d'une migratrice et hivernante rare (entre 10 et 100 ind. chaque hiver mais seulement 8 en moyenne à la mi-janvier sur la période 1997-2006) sur le littoral et quelques plans d'eau intérieurs (D). Le littoral breton fait partie des zones d'hivernages avec quelques secteurs pouvant accueillir des contingents d'importance : 85 ind. en janvier 1996 en baie de Douarnenez, 37 ind. en janvier 1992 en estuaire de Vilaine...). Plus généralement, les oiseaux sont observés sur le littoral à l'unité ou en groupes de quelques individus.


## Statut en Côtes-d'Armor

L'Harelde boréale est une migratrice et hivernante très rare et localisée en Côtes-d'Armor. Si elle est observée de manière quasi-annuelle en fond de baie de Saint-Brieuc depuis une dizaine d'années maintenant, les effectifs sont en revanche généralement compris entre 1 et 3 oiseaux. Seule l'année 2002 a vu un groupe plus important de 6 oiseaux observés depuis la pointe des Guettes (Hillion) du 8 mars au 7 avril. En baie de Saint-Brieuc, l'espèce accompagne les groupes de Macreuse noire. En dehors de la baie qui totalise un tiers des données (occurrence liée à la fois à la présence des macreuses et à la plus forte pression d'observation), l'estuaire de la Rance est le second site le

plus régulier pour l'espèce (22 % des données) mais elle y est toujours observée à l'unité. D'autres sites accueillent plus ponctuellement l'espèce : baie de Lannion, littoral du Trégor, baies de Saint-Jacut et la Fresnaye... L'Harelde boréale n'a été observée que sur un seul site intérieur : l'étang des Salles (Perret) avec 2 oiseaux présents le 25 février 2000. L'espèce est observée de mi-octobre à avril avec une nette concentration des données de novembre à février. Le dimorphisme sexuel permet souvent de distinguer les sexes et les données montrent une forte hétérogénéité.

## Tendances et perspectives

L'Harelde boréale est une espèce hivernante si rare et si fluctuante en France qu'il est difficile de définir des tendances. La présence régulière de quelques oiseaux dans le département confère dans tous les cas aux Côtes-d'Armor une importance nationale pour l'espèce. Des recherches ciblées dans les groupes de Macreuse noire ont sans doute contribué à une meilleure détection de l'espèce ces dernières années. Il convient donc de continuer à bien la rechercher et la noter. Sa présence sur les mêmes secteurs que la Macreuse noire, et notamment à proximité des concessions mytilicoles, devrait être prise en compte et peut être mieux cernée du fait des dérangements ciblés (tirs, chasse...) qui touchent cette dernière.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.