

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

L'Hirondelle de rochers niche depuis l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe et la Turquie jusqu'en Asie centrale et Sibérie orientale. En France, l'espèce est peu commune en toute période dans le quart sud-est et hiverne principalement sur le littoral méditerranéen (D). Les données en dehors de ce secteur sont rares dans l'est du pays (surtout en Alsace) et la côte atlantique avec 1 mention en Finistère (Trégunc) en 1973 (D). En Côtes-d'Armor, 2 individus auraient été identifiés le 25 avril 2003 au sein de la colonie d'Hirondelles de fenêtre des falaises de Plouha. Malgré 3 autres passages de l'observateur (les 27 avril, 30 avril et 3 mai), les individus n'ont pas été retrouvés et laissent toujours planer un doute sur cette observation qui s'inscrit toutefois dans la période d'apparition de l'espèce au nord de son aire de distribution et sur un site potentiellement attractif pour des oiseaux erratiques.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

