

# Huppe fasciée

*Upupa epops*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


La Huppe fasciée est une espèce polytypique répandue de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la mer du Japon en période de reproduction, des populations sédentaires prenant également place en Afrique et en région indienne (**B**). Les effectifs européens de l'espèce, dont le statut est jugé défavorable, sont de l'ordre de 890 000 à 1,7 million de couples nicheurs dans les années 2000 (**B**). Durant ces mêmes années, la France compte 20 000 à 30 000 couples surtout concentrés au sud-ouest d'une ligne Vannes/Nice, et la Bretagne, tout comme le nord, est une région où l'espèce demeure rare (**D**).

## Statut en Côtes-d'Armor

La Huppe fasciée est un migrateur peu commun mais régulier et un nicheur très rare en Côtes-d'Armor. Guerneur et Monnat (**G**) la signalaient comme bien répandue à l'est d'une ligne Vannes/Lamballe avec des indices de reproduction certain ou probable sur 5 mailles du département courant 1970-1975 (Rostrenen, Broons, Lamballe, Saint-Cast et Dinan). L'espèce n'était ainsi pas connue (hors passage) de secteurs bien prospectés telle la région de Saint-Brandan (**J. Petit, comm. pers.**). Ce statut de nicheur occasionnel au sud-ouest et au nord-est du

département n'a semble-t-il pas évolué depuis lors, l'espèce ne faisant l'objet que de 3 mentions avérées de nidification : 1 nid avec des jeunes dans un tas de grumes à Kergrist-Moëlou au printemps 1988 (**E**) ; 3 à 5 jeunes nourris dans la cavité murale d'une propriété au Clos Giroit (Saint-Alban) fin juillet 2001, avec des suspicions quant à une reproduction communale dès 2000 (**Loncle, 2002**) ; 1 contact fortuit avec l'espèce le 27 mai à Saint-James (Lanvallay) qui amène à l'observation d'un couple effectuant des transports de nourriture vers un chêne émondé le 4 juin 2013 (**D. Melec, comm. pers.**). La Huppe fasciée est en revanche une espèce régulièrement contactée à l'époque des migrations, davantage au passage pré-nuptial (50 mentions) que post-nuptial (14 mentions). Les arrivées printanières sont manifestes dès fin mars pour culminer aux 2 premières décades d'avril, des migrateurs étant encore notés jusque fin/mai courant juin : 1 oiseau les 5 juin 2007, 2 mai 2008 et 13 juin 2010 aux Sept-Iles (Perros-Guirec). La probable dispersion observée courant juillet qui peut tout aussi bien se rattacher, selon les cas, à des reproducteurs passant inaperçus faute de recherches, se prolonge jusqu'à octobre : 1 le 3 octobre 1991 à Plérin et 1 le 28 octobre 2001 à Keruzeau (Plouha).

**Huppe fasciée** Nidification (2004-2012)



Auteur : Guillaume Laizet  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



# Huppe fasciée

*Upupa epops*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


## Tendances et perspectives

Les informations récentes (après 2000) aux niveaux européen, français et breton laissent entrevoir une certaine stabilité de l'espèce, voire une augmentation locale des effectifs (Normandie, est du Morbihan, Loire-Atlantique et Franche-Comté) malgré certaines évolutions défavorables (disparition des cavités de nidification, utilisation de produits phytosanitaires, régression des prairies naturelles...) (**B**; **C**; **D**). Sans s'attendre à une présence régulière dans les Côtes-d'Armor, la nidification de couples

isolés, connue par le passé et sans doute encore d'actualité, pourrait se renouveler et se développer à l'avenir. Il convient donc d'être attentif aux observations de fin de printemps et de courant d'été.

## Bibliographie

**Loncle N. (2002).** La Huppe fasciée *Upupa epops* et le Potier (fasciné!). Notes sur la reproduction d'un couple de Huppe à Saint-Alban en 2001. *Le Fou*, 56: 7-10.



Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE

