

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta




Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

L'Hypolaïs polyglotte, monotypique, est présent en période de nidification de l'Afrique du Nord au sud du Benelux ; il est absent des îles Britanniques mais s'avance au sud-est à travers l'Italie, la Suisse, la Slovénie et la Croatie (**B**). En Europe, où le statut de l'espèce est favorable, les effectifs nicheurs représentent plus des trois quarts de la population totale (**B**). La France compte entre 300 000 et 500 000 couples nicheurs dans les années 2000, répartis sur l'ensemble du territoire excepté la pointe bretonne et une grande partie de l'Alsace (**D**). L'Hypolaïs polyglotte n'était en fait pas connu nicheur au nord de la Loire-Atlantique au XIX^e s., les premières mentions rendant compte d'une présence au sud-est de l'Ille-et-Vilaine en 1943, près de Rennes en 1960 et dans le golfe du Morbihan en 1961 (**G**). Par la suite l'espèce a étendu sa répartition via le sud de la région, atteignant Quimper en 1988 et Plounéour-Lanvern (Finistère) durant la dernière enquête régionale, au cours de laquelle un accroissement du nombre de mailles indicées (+36 %) montre la progression encore actuelle depuis ses bastions orientaux (**C**).

Statut en Côtes-d'Armor

Il y a peu d'éléments historiques pour décrire la présence et l'avancée de l'Hypolaïs polyglotte en Côtes-d'Armor. Elle est dite très répandue à l'est d'une ligne Vannes/Saint-Brieuc dans la première moitié des années 1970 et déjà contactée sur le littoral nord (Paimpol/Tréguier) en 1970 et dans l'intérieur (Le Bodéo) en 1972, prouvant ainsi que l'expansion s'est opérée bien auparavant (**G**). La progression vers l'ouest s'est réalisée par la suite via le centre du département au détriment du littoral nord où l'expansion a visiblement stagné voire régressé : l'espèce est notamment relevée à Bois Meur (Lanrodec) en 1988, à Coat Liou (Bourbriac) en 1992, Beffou (Loguivy-Plougras) en 1995 et Porz an Park (Plounévez-Moëdec) en 2000. La présence dans ces secteurs reste cependant toujours ponctuelle durant la dernière enquête au contraire de l'intérieur du département où l'Hypolaïs polyglotte paraît bien mieux implantée tout au long de la limite sud jusqu'à la région de Glomel. Ce secteur sud-ouest étant moins prospecté que le nord-ouest, tout porte à croire que l'espèce y est un peu plus com-



Auteur : Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Hypolais polyglotte

Hippolais polyglotta



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

mune. Absente pour l'instant de la bande côtière occidentale, elle montrerait donc deux gradients de décroissance dans le département: depuis l'est d'une part et depuis le sud-ouest d'autre part, le statut de l'espèce pouvant y être respectivement qualifié de commun à assez commun et de assez commun à peu commun. Une grande variété de milieux ouverts à semi-ouverts sont utilisés: fourrés littoraux (à l'est), parcelles forestières en régénération, friches industrielles, carrières végétalisées, aérodromes... la présence d'une végétation pionnière diversifiée en taillis, fourrés et broussailles étant l'élément commun déterminant, et ce en milieu sec comme en milieu humide.

Les premiers oiseaux se signalent dès le mois d'avril (1 le 18 avril 1994 à la Chapelle Saint-Riom (île de Bréhat)) et plus généralement courant du mois de mai (près de la moitié des données, dont 1 le 27 mai 2001 à Penn Lann (Pleubian)). Nourrissages puis familles s'inscrivent majoritairement et respectivement en juin et en juillet, seules 2 données de nidification certaine concernant le mois d'août: 1 nourrissage le 3 août 2006 au Bois Joli (Ploubalay) et 1 famille le 11 août 1995 en forêt de Beffou (Loguivy-Plougras); une seconde nichée n'est cependant pas prouvée chez l'espèce pour l'instant (Géroudet, 1998). Les départs commencent les premiers jours

d'août, les derniers oiseaux étant observés la première décade de septembre (**D**): 1 les 31 août 2005 et 28 août 2008 aux Sept-Iles (Perros-Guirec).

Tendances et perspectives

L'Hypolais polyglotte montre une progression de son aire de répartition tant en Europe (vers le nord et le sud-est; **B**), qu'en France (+64 % depuis 2001; **J**) et en Bretagne sud et centrale (**A**; **C**). Dans les Côtes-d'Armor, l'expansion vers le nord-ouest, spectaculaire jusqu'aux années 2000, s'inscrit dans cette poussée régionale. Les indices relevés sur le littoral nord durant la période 1980-1990 (**E**) n'ont curieusement pas connu de suite malgré une pression d'observation habituellement importante dans ces secteurs; seul le suivi des prochaines années permettra de mieux caractériser la probable avancée de l'espèce dans le quart nord-ouest trégorrois et de confirmer, par exemple au travers d'études sur les densités présentes, son caractère visiblement hétérogène dans le département.

Bibliographie

Géroudet P. (1998). Les Passereaux d'Europe. Tome 2. Delachaux & Niestlé. p. 57-60.

Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

