

Jaseur boréal

Bombycilla garrulus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Jaseur boréal est, comme son nom l'indique, un oiseau du nord de l'Europe et de Sibérie occidentale. Ses populations sont fortement soumises aux fluctuations de fructification d'arbres à baies, ce qui explique en partie les afflux hivernaux épisodiques que connaît l'ensemble de l'Europe. En France, où il est principalement observé dans le nord-est, le Jaseur compte en moyenne quelques dizaines d'observations chaque hiver. Les dernières invasions marquantes remontent aux hivers 1965-1966, 2004-2005 et 2012-2013 (D). En Bretagne, le Jaseur boréal reste un hivernant occasionnel qui n'est pas observé tous les ans.

Les Côtes-d'Armor comptent seulement 21 données de Jaseur boréal pour 63 individus, ce qui montre bien le caractère irruptif de l'espèce. La répartition des observations est classiquement comprise entre novembre et mars. La première observation connue date de 1959 avec 2 individus observés à Perros-Guirec tandis que l'afflux le plus marquant pour le département date de l'hiver 2012-2013, avec un total de 52 oiseaux signalés. La majorité de ces observations a été effectuée sur le littoral nord du département (Paimpol, Pleubian, Lannion, île de Bréhat, Ploubazlanec...) où ils fréquentaient les jardins, les parcs et les vergers. Les autres signalements concernent Paimpol (février 2011), Plouzélambre (janvier 2010), Plérin (février à mars 2003) et Dinan (novembre 1981).



Auteur : Corentin Morvan
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.