

# Labbe à longue queue

*Stercorarius longicaudus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

Le Labbe à longue queue est une espèce polytypique qui niche dans les zones arctiques et subarctiques. La sous-espèce nominale se reproduit de la Scandinavie à la Sibérie (D). En France, il s'agit d'un migrateur rare à occasionnel mais régulier sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord (D). Il est surtout détecté en migration postnuptiale de fin août à début novembre (D). En Bretagne, l'espèce est quasi annuelle sur le site de Brignogan mais reste globalement occasionnelle.

En Côtes-d'Armor, on compte 12 données se rapportant à l'espèce et qui se concentrent assez logiquement sur l'ouest du Trégor: 1 ind. le 25 août 1987 à l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou) signalé

également par un autre observateur belge à Trégastel mais rejeté par le CHN, 1 le 27 août 1990 à l'Île-Grande, 1 le 16 août 1999 à l'Île-Grande, 1 le 22 août 2005 à Ploumanac'h (Perros-Guirec), 1 juvénile trouvé mort le 7 septembre 2005 sur l'île aux Moines (Perros-Guirec), 2 juvéniles ensemble le 17 octobre 2005 près de l'île Rouzic (Perros-Guirec), 2 dans le chenal des Sept-Iles (Perros-Guirec) le 16 août 2007, 1 près de l'île Saint-Riom (Ploubazlanec) le 4 septembre 2007, 1 le 3 décembre 2009 depuis la presqu'île Renote (Trégastel), 1 le 10 octobre 2010 à la pointe de Minard (Plouézec), 1 le 12 septembre 2011 depuis le phare du Paon à Bréhat et 1 le 19 septembre 2012 depuis la jetée de Binic.

Labbe à longue queue Distribution (1983-2013)



Labbe à longue queue Répartition hivernale (2009-2013)

