

Locustelle luscinoïde

Locustella luscinioides



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Locustelle luscinoïde présente une très large aire de distribution en période de reproduction, allant du nord de l'Afrique en passant par l'Europe (la Roumanie en étant très nettement le bastion) jusqu'au Kazakhstan à l'est (**D**). En France, après une progression des effectifs perçue au cours de la première moitié du XX^e s., c'est une baisse notable qui ne cesse d'être mise en évidence depuis les années 1970-1980. Elle entraîne logiquement son classement *En Danger* sur la Liste Rouge des espèces menacées en France (**D** ; **U**). La Bretagne (Loire-Atlantique comprise), qui regroupait dans les années 2000 la moitié des effectifs nicheurs nationaux, connaît également ce déclin notamment imputable à des conditions d'hivernage difficile au Sahel et à la dégradation des grandes roselières (biotope préférentiel) (**C**). Les Côtes-d'Armor ne constituent a priori qu'un lieu de passage rare pour l'espèce. Elle fut néanmoins contactée sur des secteurs potentiellement propices à la reproduction :

- le 2 mai 1987 au Pont de Cieux (Pleudihen-sur-Rance)
- le 20 juin 1987 à l'étang de Saint-Bihy
- les 15, 16 et 30 avril 1996 au marais du Quellen (Trébeurden).

Au vu des tendances actuelles, il y a peu de chance de trouver cet oiseau nicheur dans le département, voire même de le recontacter lors de son passage migratoire.



Auteur : Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.