

Martinet à ventre blanc

Tachymarptis melba



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Martinet à ventre blanc se reproduit dans le sud de l'Europe, depuis le Portugal jusqu'aux rivages de la mer Caspienne. En France, il niche principalement sur les falaises continentales ou littorales du sud-est et également sur des édifices élevés (cathédrales, ponts, remparts, combles) (**D**). L'espèce rejoint le sud de l'Afrique durant l'hiver et c'est à l'occasion de ces mouvements migratoires (surtout pré-nuptiaux) que l'espèce a pu être contactée à 18 reprises, au minimum, depuis 1988 en Bretagne (**D**; **Ar Vran**). Ces données concernent exclusivement le pourtour littoral et principalement les grandes îles bretonnes : Ouessant, Belle-Ile, Houat et Hoëdic (9 des 10 données hors Côtes-d'Armor). Le mois d'avril (6 données) semble le plus propice à sa rencontre en Bretagne mais il a plus largement été noté au mois de mai, juin et juillet (8 données en tout), octobre (3) et novembre (1).

En Côtes-d'Armor, les 8 mentions de l'espèce s'inscrivent dans ce phénomène d'oiseau noté quasiment à l'unité, d'avril à juillet puis en octobre sur le pourtour littoral :

- les 2 octobre 1990, 24 avril 1993 et 6 mai 2014 au cap Fréhel (Plévenon)
- les 18 avril 1996 et 23 juillet 2005 à Perros-Guirec
- 3 ind. mentionnés le 5 juillet 2008 à Croaz Ru (Lannion).
- le 10 juin 2008 au bourg de Morieux
- le 18 avril 2014 à Kermouster (Lanmodez).



Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.