

# Mésange noire

*Parus ater*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


La Mésange noire est une espèce polytypique à large répartition, présente de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'est du continent asiatique. Elle est absente du nord de la Russie et du Moyen-Orient. La population européenne est estimée à environ 12 à 19 millions de couples (**B**), pour 200 000 à 500 000 couples en France, surtout concentrés en zone montagnarde riche en conifères âgés (**C**). En Bretagne, la Mésange noire s'est concentrée sur les zones de reliefs de la Basse-Bretagne, profitant encore localement du vieillissement des plantations de résineux (**C**). La Mésange noire est localement sédentaire mais des irruptions périodiques ont lieu certains hivers (1993, 1996, 2000, 2005, 2008, 2012), laissant parfois de nouveaux reproducteurs sur place.

## Statut en Côtes-d'Armor

Au cours de la période de nidification, la distribution géographique de la Mésange noire est morcelée en Côtes-d'Armor et les lieux de reproduction sont localisés. Essentiellement observée sur des secteurs de relief, la Mésange noire occupe des habitats de résineux le plus souvent âgés et situés au sein de

massifs forestiers où elle est facilement détectable au chant. En Côtes-d'Armor, elle est présente dans la quasi totalité des grandes forêts. Une étude menée en 2012 sur le massif d'Avaugour-Bois Meur a par exemple permis de révéler une certaine abondance de l'espèce liée à la présence de conifères âgés (**GEOCA, 2013**). Dès l'automne, certaines années, l'espèce peut périodiquement être observée en plus grand nombre du fait de renforcement d'individus nordiques qualifiés d'irruptifs. Les suivis de migration postnuptiaux effectués dans le département indiquent des effectifs comptabilisés allant du tout à rien. Lorsqu'elle migre, la Mésange noire est alors observée sur les sites de suivi en migration rampante, les individus se déplaçant de buisson en buisson. A l'automne 2012, année de la dernière irruption en Côtes-d'Armor, plus de 128 individus ont ainsi été observés à la Cotentin (**T**). Au printemps 2013, des groupes ont également été observés en migration pré-nuptiale le long de la côte occidentale de la baie de Saint-Brieuc. A noter, pour l'anecdote, la présence de Mésanges noires au large des côtes de la baie de Saint-Brieuc durant des suivis en mer effectués en octobre 2008, lors d'une spectaculaire irruption ayant touché le littoral et les îles bretonnes.

Mésange noire Nidification (2004-2012)



Auteur : Sébastien Théof  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE



# Mésange noire

*Parus ater*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


En hiver, la Mésange noire peut être observée partout et parfois en grand nombre pourvu que l'on se situe dans une année d'irruption. Elle est même observée dans les jardins et aux mangeoires comme en témoignent les observations réalisées au cours du comptage *Oiseaux des jardins* (**K**). Toutefois, de par la difficulté d'identification et surtout de discrimination avec sa proche cousine la Mésange charbonnière, les résultats obtenus pour cette espèce dans les opérations de sciences participatives ne peuvent être pris en compte. Lors des hivers où l'espèce est présente en nombre comme en 2012, la totalité des mailles est sans doute occupée. Cependant, le manque de prospection engendre une

forte hétérogénéité de sa distribution hivernale qui reste à prendre avec précaution du fait des variabilités interannuelles.

## Tendances et perspectives

La Mésange noire bénéficie d'un statut favorable en Europe (**B**). En revanche à l'échelle nationale, elle aurait perdu 46 % de sa population depuis 1989 et se trouve considérée comme *Quasi menacée* (**J**). Les perspectives ne sont pas évidentes pour cette espèce mais certaines pratiques forestières pourraient ne pas convenir à cette mésange déjà spécialisée (**C**).

**Mésange noire** Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Sébastien Théof  
Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances*. Saint-Brieuc, 416 p.