

Mésange nonnette

Parus palustris



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Mésange nonnette colonise une grande partie des boisements feuillus et mixtes du Paléarctique. En France, il s'agit d'une nicheuse sédentaire ou erratique commune (500 000 à 800 000 couples dans les années 2000) (**D**). En Bretagne, l'espèce est absente ou rare sur la frange littorale et semble connaître une régression assez nette entre les enquêtes régionales 1980-1985 et 2004-2008 (**C**). Elle reste toutefois bien présente et commune dans les massifs forestiers et les grands boisements.

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Mésange nonnette est une nicheuse sédentaire assez commune dans les grands massifs boisés, plus rare dans les petits bois et vallées boisées. Elle est souvent discrète et parfois peu abondante ce qui peut conduire à une sous-estimation des effectifs ou des densités réelles, même si de grands secteurs ne sont réellement pas occupés, notamment sur le littoral. L'atlas de Saint-Brieuc/Plérin réalisé en 2012 n'a ainsi permis de contacter l'espèce que sur une seule maille, dans la vallée boisée du Gouët (**P**). En revanche, les suivis effectués au sein de grands massifs forestiers permettent de constater une présence plus marquée et des populations plus conséquentes. A Avaugour-Bois Meur par exemple, la Mésange nonnette se place à la 15^e position des espèces en termes de fréquence sur les 44 points d'écoute réalisés en



2013, derrière les Mésanges charbonnière (13^e) et huppée (14^e) mais devant la Mésange bleue (17^e) (**GEOCA, 2014**). En hiver, un certain erratisme est constaté et les oiseaux fréquentent des milieux plus ouverts : zones bocagères, jardins (parfois notés aux mangeoires), bords d'étangs, zones humides... L'espèce est ainsi fréquemment notée aux abords des zones humides intérieures lors des suivis *Wetlands* menés à la mi-janvier.

Tendances et perspectives

Considérée en déclin en Europe et en France, la Mésange nonnette n'est pas jugée menacée mais mérite une surveillance accrue de ses populations (**B**; **U**). Son adaptabilité à une grande diversité de milieux boisés lui permet toutefois d'être encore largement distribuée même si le raccourcissement des cycles forestiers et une diminution des vieux arbres pourraient lui porter préjudice à moyen terme.

Bibliographie

GEOCA (2014). Suivi du peuplement avifaunistique nicheur de l'Espace Naturel Sensible de la forêt départementale d'Avaugour/Bois-Meur (Côtes-d'Armor – année 2013). Richesse et évolution du peuplement. Influence des accrues forestiers sur l'avifaune nicheuse de jeunes parcelles de résineux. Conseil Général des Côtes-d'Armor. 90 p.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.