

Mouette de Sabine

Xema sabini



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, la Mouette de Sabine se reproduit dans l'Arctique canadien, en Alaska, au Groenland et en Sibérie (D). Très pélagique, elle est visible sur les côtes françaises (Manche et surtout Atlantique) lors de sa migration postnuptiale (fin août à fin octobre surtout) pour rejoindre ses quartiers d'hivernage atlantique, notamment au large de l'Afrique. Elle reste toutefois peu commune et irrégulière à cette période et surtout observée à la suite de conditions météorologiques particulières ou lors de sorties en mer dédiées (côte atlantique notamment). Son observation est plus exceptionnelle en hiver et au printemps (D). En Bretagne, l'espèce est régulière mais souvent en faibles effectifs sur les côtes de la Manche (jusqu'à 53 le 10 septembre 1998 à Brignogan) tandis qu'elle est plus régulière à la pointe bretonne (200 à Ouessant le 10 septembre 1998) et surtout plus abondante sur la côte atlantique où elle est régulière au large du Morbihan (Mor Braz, secteur de Groix...).

Statut en Côtes-d'Armor


La Mouette de Sabine est une migratrice rare en Côtes-d'Armor et une hivernante exceptionnelle. Elle n'est pas observée chaque année du fait d'une pression de guet à la mer assez faible. On distingue surtout deux types de données : des observations d'oiseaux en passage souvent notés à l'unité sur des sites de guet à la mer à l'automne : Trégastel, Ile-Grande, cap Fréhel et des données d'oiseaux en stationnement sur des sites littoraux abrités correspondant potentiellement à des oiseaux fatigués,

en halte (étang du Vorlen (Trédrez-Locquémeau), Martin Plage (Plérin), estuaire du Jaudy, Port Lazo (Plouézec)... Environ 90 % des données font état d'oiseaux isolés, majoritairement des jeunes de l'année ou immatures, ce qui explique peut être leur état de fatigue et leur observation littorale. Quelques adultes sont signalés. Un maximum de 4 oiseaux groupés est observé le 21 octobre 1987 à la pointe des Guettes (Hillion).

Les observations départementales s'échelonnent du 23 août au 21 décembre. Les données tardives correspondent pour la plupart à des stationnements longs de jeunes oiseaux : en décembre 1997 sur l'estuaire du Jaudy, en novembre 2000 et novembre 2009 en fond de baie de Saint-Brieuc. Quelques autres données de novembre proviennent du cap Fréhel.

Tendances et perspectives

La Mouette de Sabine reste une espèce migratrice rare et peu détectée sur le littoral des Côtes-d'Armor. La majeure partie des observations correspond à des oiseaux rabattus à la côte et potentiellement fatigués. Le développement de sorties en mer en baie de Saint-Brieuc n'a pas permis d'augmenter le nombre de contacts avec l'espèce qui reste logiquement rare sur les côtes de la Manche comme le montrent les suivis de guet à la mer dans le détroit du Pas-de-Calais (quelques dizaines d'oiseaux les meilleures années ; D). Son statut ne devrait donc guère évoluer dans les années à venir.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.