

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, la Mouette rieuse est largement distribuée à travers l'Eurasie, de l'Islande au Kamchatka (D). En France, il s'agit d'une nicheuse commune (35 000 à 45 000 couples) sur certains marais et étangs intérieurs, et d'une migratrice et hivernante très commune surtout sur le littoral avec 1,2 millions d'oiseaux recensés en 1996-1997 (D). La Bretagne apparaît en tête des régions d'hivernage avec 213 000 ind. recensés en 2004-2005 alors même que l'espèce ne s'y reproduit que de manière récente et occasionnelle (5 couples durant l'enquête 2004-2008) tandis qu'elle niche communément dans les marais de Loire-Atlantique (C).

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, la Mouette rieuse est une migratrice et hivernante très commune sur l'ensemble du département. Elle fréquente à la fois le littoral (plages, vasières, ports...), les plans d'eau intérieurs mais aussi les labours, prairies... Certains secteurs comme la Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc font l'objet de comptages annuels réguliers mais le reste du département n'est suivi que lors des enquêtes nationales. Les 3 dernières ont permis de recenser respectivement 33 745 oiseaux (1996-1997), 27 951 (2004-2005) et 35 682 (2011-2012), soit une relative stabilité des effectifs sur les principaux dortoirs que sont le fond de baie de Saint-Brieuc (environ 10 000), la Rance maritime (environ 10 000) et les baies de Saint-Jacut/Lancieroux/Fresnaye (environ 8 000). Ces effectifs restent toutefois très certainement sous-évalués puisque de nombreux sites mineurs ou intérieurs ne sont pas comptabilisés.


En termes de phénologie, les premiers oiseaux sont notés dès le mois de juin, y compris des jeunes oiseaux de l'année, présents dès la fin de ce mois. Durant l'été et l'automne, les contingents augmentent progressivement par l'arrivée d'oiseaux d'Europe du nord-est et des Pays baltes (origine confirmée par les quelques lectures locales de bagues). L'espèce est encore bien notée jusqu'en mars (pic de passage pré-nuptial en France), beaucoup moins présente en avril et le mois de mai est sans doute le plus pauvre en oiseaux.

La reproduction de la Mouette rieuse a déjà eu lieu de manière ponctuelle dans le département. Des indices certains (œufs et poussins) ont ainsi été obtenus sur Goulmédec (Pleumeur-Bodou) en juin 1970, dans le secteur de Pléboulle/Saint-Cast toujours en 1970 (G), sur l'île d'Er (Plougrescant) en juin 1975 et sur l'archipel de Bréhat en juin 2002. Ces reproductions sont toutefois occasionnelles et sans suite.

Tendances et perspectives

La Mouette rieuse n'apparaît pas menacée à l'échelle européenne ou française et les Côtes-d'Armor voient plutôt une stabilité des effectifs au cours des deux dernières décennies. Elle profite localement de la mixité des ressources alimentaires entre le littoral (vasières surtout) et les zones agricoles littorales et intérieures, ce qui semble lui assurer des ressources pérennes à moyen terme. La reproduction de l'espèce reste localement occasionnelle et ne devrait pas se développer au vu de la pauvreté en marais favorables.

Mouette rieuse Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.