

# Mouette tridactyle

*Rissa tridactyla*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


Espèce polytypique, la Mouette tridactyle niche dans l'Hémisphère Nord où elle est l'un des oiseaux de mer les plus abondants avec 5 millions de couples. En Europe, elle se reproduit du cap Nord à la péninsule Ibérique avec des effectifs décroissants vers le sud. En France, il s'agit d'une nicheuse peu commune et localisée sur des falaises littorales et îlots marins (moins de 6 000 couples), d'une migratrice commune et d'une hivernante peu commune (**D**). Plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux sont comptabilisés à l'automne sur les sites de migration comme le Clipon (**D**). La Bretagne fut longtemps le bastion historique de l'espèce jusqu'au milieu des années 1970 où elle a conquis la Normandie et la façade atlantique (**C**). Aujourd'hui la Bretagne compte moins d'un millions de couples et seulement 8 colonies, plusieurs ayant été désertées au cours des dernières décennies (**C**). En migration, le site de Brignogan voit des passages journaliers importants en novembre et décembre essentiellement, avec des pics à plusieurs centaines ou milliers d'oiseaux (record de 2 245 le 14 novembre 2013) ([www.trektellen.nl](http://www.trektellen.nl)).

## Statut en Côtes-d'Armor

La Mouette tridactyle est une nicheuse extrêmement localisée en Côtes-d'Armor, une migratrice commune sur le littoral et en mer et une hivernante commune mais peu abondante au large. En période de reproduction, seul le cap Fréhel abrite encore une colonie de reproduction qui comptait 49 couples en 2009 (année du dernier recensement national) et 55 à 60 couples en 2011, soit seulement 5 % des effectifs régionaux et moins de 2 % des effectifs nationaux (**FE**). Deux colonies départementales qui existaient lors de l'enquête 1980-1985 ont disparu : les Sept-Iles (Perros-Guirec) et l'Amas du cap (Plévenon). Par ailleurs, la population départementale, riche de 200 à 300 couples dans les années 1960 à 1980 a connu un fort déclin au cours des années 1990. Aujourd'hui la stabilité semble retrouvée et on note même une nouvelle dynamique qui reste à confirmer.

En migration, la Mouette tridactyle peut être observée sur des sites littoraux comme sur la presqu'île Renote (Trégastel) où les effectifs journaliers sont

**Mouette tridactyle** Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



# Mouette tridactyle

*Rissa tridactyla*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

les plus élevés en novembre ou décembre (record de 396 le 9 décembre 2006, 360 le 3 décembre 2009, 279 le 5 novembre 2009, 278 le 14 novembre 2013...), l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou), le littoral du Trégor... Elle fréquente également des zones de stationnement alimentaire (pêcheries) en baie de Saint-Brieuc ou en baie de Lannion. Il n'est pas rare alors que l'espèce côtoie d'autres mouettes comme la Mouette pygmée, la Mouette mélanocéphale et la Mouette rieuse. En hiver, la Mouette tridactyle est une espèce pélagique qui s'observe peu des côtes mais s'avère assez régulière un peu plus au large. Elle fréquente les zones maritimes à l'unité ou en petits groupes mais connaît une distribution spatiotemporelle assez variable sans doute liée à d'importants déplacements et aux conditions météorologiques.

## Tendances et perspectives

Si le statut européen et français de la Mouette tridactyle n'est pas inquiétant malgré un déclin modéré des effectifs (**B** ; **U**), la situation départementale et régionale en période de reproduction s'est considérablement fragilisée (**C**). Aux frontières de la répartition mondiale de l'espèce, les Côtes-d'Armor n'abritent qu'une population marginale et forcément vulnérable. Les mesures de gestion entreprises localement au cap Fréhel peuvent permettre de conserver à court terme la colonie mais seule la dynamique plus globale de l'espèce permettra ou non de la garder sur la liste des nicheurs départementaux. En ce qui concerne la migration et l'hivernage, il est difficile d'émettre un avis sur les tendances possibles par manque de connaissance mais le développement de suivis offshore devrait permettre de mieux définir son statut au large des côtes bretonnes.

**Mouette tridactyle** Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département

