

Oie des moissons

Anser fabalis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, l'Oie des moissons se reproduit dans les zones arctiques d'Amérique du Nord et du Paléarctique (Y). En France, il s'agit d'une hivernante (dans l'est du pays) et migratrice peu commune (la sous-espèce *fabalis* étant devenue la plus rare) (D). En Côtes-d'Armor, les premières données remontent à l'hiver 1978-1979, particulièrement rigoureux, et qui a entraîné une dispersion plus importante de l'espèce. Ainsi, un vol de 50 individus allant vers le sud a été noté le 20 décembre 1978 dans l'anse d'Yffiniac. Egalement, 3 individus présents en baie de Saint-Jacut-de-la-Mer, seule observation qui n'aura pas lieu en fond de baie de Saint-Brieuc (**Ar Vran 18**). Le fond de baie de Saint-Brieuc accueillera 1 individu de la sous-espèce *rossicus* du 23 décembre 1995 au 2 février 1996. La même année, 1 individu sera noté dans l'anse d'Yffiniac le 24 octobre, puis 3 le 11 novembre et à nouveau 1 le 24 novembre. Autre séjour du 8 décembre 2003 au 21 février 2004, d'un groupe comprenant 1 à 4 individus. Du 17 janvier au 25 février 2009, 1 Oie des moissons est contactée à Bourienne (Langueux) et sur la route d'Hillion/Yffiniac. Enfin, 1 individu (sous-espèce *rossicus*) à l'origine douteuse est noté du 23 avril au 8 mai 2014 en compagnie de 3 Oies cendrées et d'une Oie à tête barrée.

Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

