

Panure à moustaches

Panurus biarmicus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique de la zone paléarctique, la Panure à moustaches se reproduit dans les grands marais riches en roseaux. En France, où l'espèce est apparue massivement en 1965 en provenance des Pays-Bas, elle niche exclusivement dans les grands marais littoraux où la population globale se situe entre 3 000 et 9 000 couples (**B**). Avec plusieurs centaines de couples, dont 200 à 300 en baie d'Audierno, la Bretagne constitue actuellement le second bastion de l'espèce en France derrière le littoral méditerranéen (**C**).

Les Côtes-d'Armor totalisent seulement 9 données de Panure à moustaches entre 1992 et 2001, toutes obtenues en période hivernale. Elles se répartissent sur 4 sites :

- 1 mâle le 27 décembre 1972 à l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou)
- 2 mâles à Port Blanc (Penvénan) le 16 janvier 1978
- 1 mâle le 1^{er} décembre 1984 et 1 mâle entre le 11 novembre et le 19 décembre 1987 en baie de Lanciaux (Saint-Jacut-de-la-Mer)
- 3 femelles le 24 avril 1988, 1 le 18 novembre 1988 et 1 mâle et 1 femelle le 4 mai 2001 au marais du Quellen (Trébeurden).

A noter également des observations en 1988 sur le marais des Guettes en Rance maritime (Ille-et-Vilaine). La rareté des marais et grandes roselières dans le département limite logiquement les rencontres avec l'espèce et rend très peu probable sa colonisation future.



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

