

# Pic épeiche

*Dendrocopos major*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Pic épeiche est une espèce commune dont l'aire de répartition s'étend de l'Europe de l'Ouest au Japon. Absent des secteurs les plus septentrionaux de l'Eurasie et de l'Irlande, il peut être observé localement au Maroc et au nord-est de l'Algérie, présent partout tant que des boisements sont présents (**D**). En France, il est présent sur tout le territoire, y compris la Corse (**D**). Les données STOC indiquent que la population de Pic épeiche se porte bien puisqu'il connaît une progression de 75 % depuis 1989 et de 15 % depuis 2001, une situation valable pour toutes les espèces forestières généralistes (**VN**). Le phénomène semble généralisé à toute l'Europe, puisque la population y a augmenté de 40 % entre 1980 et 2005 (**EB**). En Bretagne, la progression se ressent également puisque la population nicheuse couvre maintenant toute la région, excepté les grandes îles arborées (Ouessant, Belle-Ile...) (**C**).

## Statut en Côtes-d'Armor


Présent toute l'année et en grande partie sédentaire, le Pic épeiche est le pic le plus abondant du département. La faible sélectivité des milieux forestiers qu'il fréquente fait qu'on le rencontre, bien évidemment en forêt, dans le bocage, les bois clairs

mais aussi dans les parcs des agglomérations ou dans les bandes boisées bordant les cours d'eau ou le bâti.

Le Pic épeiche niche sur l'ensemble du département, les quelques zones sans indice se rapportant à des défauts de prospection. Il est également régulièrement noté nicheur sur Bréhat, dans les quelques bosquets de l'île. La réalisation récente de l'atlas des oiseaux nicheurs Saint-Brieuc/Plérin confirme la faculté de cette espèce à coloniser la moindre parcelle boisée. L'espèce est d'ailleurs finalement plus rare sur la commune de Plérin, plus rurale mais moins boisée, qu'à Saint-Brieuc où elle profite des parcs et des jardins arborés (**P**). Tous les bois du département abritent cette espèce avec des densités toutefois mal connues.

En hiver, le Pic épeiche est également présent sur l'ensemble du territoire, fréquentant alors aussi bien les haies boisées que les mangeoires. Les 6 années consécutives de suivi participatif *Oiseaux des jardins* le placent chaque année entre la 15<sup>e</sup> et la 20<sup>e</sup> place pour une fréquence légèrement inférieure à 20 % des jardins, soit largement plus que le Pic vert (moins de 10 % des jardins). Les observations

Pic épeiche Nidification (2004-2012)



Auteur : Frédéric Guyomard

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances.* Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



# Pic épeiche

*Dendrocopos major*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor


**G.E.O.C.A**

ne concernent généralement qu'un individu à la fois (**K**). Peu d'indices de migration active sont notés en Côtes-d'Armor mais les suivis à la Cotentin (Planguenoual) permettent ou permettront de déceler des phénomènes d'invasion, même assez légers comme à l'automne 2011 (**T**). Ces données peuvent d'ailleurs être couplées au suivi *Oiseaux des jardins* qui renseigne également sur la fréquence de l'espèce durant l'hiver suivant une invasion, comme ce fut le cas pour le Geai des chênes en 2012.

## Tendances et perspectives

Il y a peu d'inquiétude concernant le devenir immédiat du Pic épeiche dans le département. Cependant, comme le montre l'atlas des oiseaux nicheurs Saint-Brieuc/Plérin, des études plus fines sur les densités de population par type de milieu amélioreraient les connaissances sur le statut de cette espèce mais aussi sur d'éventuelles préconisations quant à l'aménagement de certains boisements, notamment les parcs urbains (**P**).

**Pic épeiche** Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Frédéric Guyomard

Extrait de GEOCA (2014). *Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances*. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département

