

# Pic noir

*Dryocopus martius*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**


Espèce polytypique, le Pic noir se distribue largement en Europe et en Asie (**D**). En France, il s'agit d'une espèce sédentaire peu commune qui occupe divers types de boisements et qui compte entre 20 000 et 30 000 couples nicheurs dans les années 2000 (**D**). C'est l'une des espèces qui a connu la plus forte expansion géographique en France à partir des années 1950 puisqu'il a colonisé presque l'ensemble de la métropole à partir des massifs montagneux. En Bretagne, les premiers contacts ont lieu en 1981 dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Les autres départements sont conquis progressivement en 1987 (Morbihan), 1988 (Côtes-d'Armor) et 1999 (Finistère) (**C**; **Garoché & Sohier, 1992**). En 2008, la population régionale dépasse probablement les 600 couples et se distribue sur l'ensemble du territoire (**C**).

## Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, le Pic noir est signalé pour la première fois en octobre 1990 dans le bois d'Yvignac mais des renseignements pris auprès du responsable local de la DDA confirme la présence et même la reproduction de l'espèce (loge) localement depuis le printemps 1988 (**Garoché & Sohier,**

**1992**). En 1991 et 1992, la reproduction est suivie de près sur ce même site et des loges sont également découvertes en forêt de Coëtquen (**Garoché & Sohier, 1992**). En 1993, des oiseaux sont contactés ou des loges trouvées en forêts de Loudéac, de Boquen, de Lorge et de La Hunaudaye. En 1994, 2 nouveaux sites sont signalés : le bois de la Motte (Pleslin-Trigavou) et les Villots (Léhon). En 1996, l'ouest est conquis avec des signalement à Plougras et Saint-Nicolas-du-Pélém. En 1997, le nombre de données explose et l'espèce est trouvée à Traou Nez (Plourivo) et au bois de Beauport (Paimpol). Par la suite, l'espèce est signalée dans de nombreux autres boisements de manière ponctuelle. Le Pic noir fréquente alors aussi bien les grandes forêts que de petits boisements ou des parcs riches en vieux hêtres. Il occupe notamment les bords de la Rance et d'autres sites littoraux (Plestin-les-Grèves, littoral du Trégor...). Sa distribution hivernale est globalement la même puisque les couples sont très sédentaires mais certains sites ne semblent occupés qu'en hiver comme le cap d'Erquy où l'espèce a été signalée deux années consécutives en 2012 et 2013. Dans les années 2000, le Pic noir est distribué sur l'ensemble du département mais reste sans

**Pic noir** Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor  
le Département



Région  
BRETAGNE



# Pic noir

*Dryocopus martius*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

doute absent de certains secteurs pauvres en vieux boisements favorables. De plus, la taille importante des territoires rend la densité assez faible et donc les chances de détection moindres.

## Tendances et perspectives

Le Pic noir jouit d'un statut plutôt favorable actuellement du fait de son dynamisme récent en Europe et en France (**B** ; **U**). Toutefois, sa dépendance aux vieux arbres morts et aux hêtraies le rend fragile au vu de l'évolution des pratiques forestières en

Bretagne et ailleurs. Le rajeunissement en cours des forêts et les coupes de vieux arbres pourrait donc être préjudiciables à cette espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et qui, comme telle, se doit d'être prise en compte dans la gestion sylvicole à venir.

## Bibliographie

**Garoché J. & Sohier A. (1992).** Nidification du Dryocope (*Dryocopus martius*) dans les Côtes-d'Armor en 1991. *Le Fou*, 28: 5-21.

**Pic noir Répartition hivernale (2009-2013)**

