

Pipit rousseline

Anthus campestris



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Le Pipit rousseline se reproduit dans le Paléarctique occidental jusqu'en Iran, en Sibérie et au nord-ouest du Kazakhstan. Il hiverne en Afrique dans la région sahélienne. En France, il s'agit d'un nicheur et migrateur peu commun, plutôt cantonné au sud du pays et au littoral sud-atlantique. En Bretagne, l'espèce est rare et détectée uniquement en migration (**D**).

En Côtes-d'Armor, les quelques données disponibles concernent toujours 1 à 2 individus observés en migration active ou en stationnement migratoire, souvent en compagnie d'autres passereaux migrateurs comme le Traquet motteux : 1 individu au barrage de Guerlédan (Mûr-de-Bretagne) le 14 novembre 1976, 1 individu est vu à l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou) le 30 octobre 1988, 2 individus sont notés en passage à Sables-d'Or-les-Pins (Fréhel) le 17 septembre 1990, 1 individu le même jour au cap Fréhel (Plévenon), 1 sur le camping de Landrellec (Pleumeur-Bodou) le 12 juillet 1994, 2 individus sur l'île Aganton (Pleumeur-Bodou) le 10 août 2005, 1 ind. est contacté dans le polder de Ploubalay le 4 mai 2009, 1 ind. en vol vers l'est au dessus de Plélan-le-Petit le 18 mai 2010.

Lors des suivis de la migration à la Cotentin (Planguenoual), des doutes sont parfois émis sur des contacts sonores dont l'identification est difficile (notamment un cri suspect le 3 octobre 2011) d'autant que l'espèce passe annuellement sur le site de Carolles (Normandie).



Auteur : GEOCA

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

