

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Le Pluvier argenté est une espèce monotypique qui niche dans les zones arctiques russes et américaines (**D**). Les effectifs nicheurs européens sont considérés comme faibles: 2 100 à 10 500 couples (**N**). En France, le Pluvier argenté peut s'observer dès la mi-juillet au moment du passage postnuptial, et est considéré comme un hivernant commun et régulier. La population hivernante française, comprise entre 25 305 et 39 235 individus au début des années 2010 (**WI**), se distribue largement sur la côte Manche-Atlantique et en diverses localités sur le rivage méditerranéen. En janvier 2013, 33 % de la population hivernante nationale ont été dénombrés en Bretagne, avec une plus forte proportion d'individus présents sur le littoral de la Bretagne Nord (de la baie du Mont-Saint-Michel à Ouessant) que sur celui de la Bretagne Sud.

Statut en Côtes-d'Armor

Le Pluvier argenté est un migrateur et hivernant commun en Côtes-d'Armor où il peut être observé partout sur le littoral (une cinquantaine de communes visitées), à l'exception des côtes à falaises du Goëlo. Sur le littoral, le Pluvier argenté fréquente tous types de milieux naturels (plages, estuaires,

estran rocheux, baies) et s'observe également parfois dans les ports. Toutefois, les effectifs hivernaux les plus importants se concentrent en 2 secteurs géographiques: la baie de Saint-Brieuc d'une part, et le secteur de la baie de Paimpol et estuaires Trieux/Jaudy d'autre part. Sur ce dernier, le seuil d'importance nationale pour l'hivernage est régulièrement atteint et c'est le seul site dans ce cas dans le département sur la période 2000-2009 (488 ind. en moyenne) (**W**). Sur la période 2009-2013, l'effectif hivernant moyen y est même de 936 individus (**WI**). Les grèves de Pleubian (Sillon de Talbert, Penn Lann) peuvent rassembler une forte proportion de ces oiseaux: l'île Blanche et le Sillon Noir constituent de remarquables reposoirs de marée haute pour l'espèce (900 individus le 16 janvier 1997, 565 individus le 15 janvier 2012 par exemple). En baie de Saint-Brieuc, les effectifs hivernants sont moins importants: 192 individus en moyenne en hiver sur la période 2009-2013 (**WI**). En revanche, c'est en ce lieu que les plus gros rassemblements pré-nuptiaux ont été signalés dans le département. Sur les 6 mentions de groupes de plus d'un millier d'individus, 4 proviennent de l'anse d'Yffiniac: 2 200 individus le 12 février 1994, 1 400 individus le 19 février 1995, 4 250 individus le 15 mars 1998,

Pluvier argenté Répartition hivernale (2009-2013)



Pluvier argenté

Pluvialis squatarola



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

2095 individus le 6 mars 1999. En hiver, de belles bandes de Pluvier argenté constituées de plusieurs dizaines d'individus sont également contactées en baie de Lannion, sur les estrans de Trégastel à Perros-Guirec, en baies de Saint-Jacut-de-la-Mer et de la Fresnaye ainsi que sur la Rance maritime (W).

Tendances et perspectives

Dans les Côtes-d'Armor, les effectifs hivernants de Pluvier argenté, qui représentent 10,4 % de la

population hivernante régionale, montrent une tendance stable entre 2000 et 2009 alors que sur cette même période les effectifs de Pluvier argenté en hiver ont diminué de 29 % en Bretagne (W). Au vu de l'importance numérique de certains secteurs, il convient de conserver une quiétude maximale sur les zones d'alimentation et de repos car le dérangement par les activités humaines peut limiter les effectifs et affecter l'utilisation des sites.



Auteur : Julien Houron

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

