

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, le Pouillot de Bonelli se reproduit dans le nord-ouest de l'Afrique et dans l'ouest et le centre de l'Europe et hiverne en Afrique tropicale (**D**). En France, il s'agit d'un nicheur et migrateur commun (100 000 à 300 000 couples estimés dans les années 2000) sauf en Corse, dans le nord-ouest, le nord et le nord-est (**D**). En Bretagne, le Pouillot de Bonelli est connu depuis le XIX^e s. mais jamais considéré comme abondant du fait de sa situation en marge d'aire de répartition (**G**). Après une légère progression entre les années 1930 et 1970, l'espèce reste cantonnée et localisée dans les grands massifs boisés d'Ille-et-Vilaine (**A**). Le dernier indice de reproduction obtenu en Bretagne date de 2001 en forêt de Saint-Aubin-du-Cormier (**Février et al., 2001**). Depuis, quelques données de migrateurs sont recensées ponctuellement.

En Côtes-d'Armor, 3 mentions de l'espèce seulement sont rapportées et aucun indice de reproduction probant n'a jamais été relevé. Au vu du statut de l'espèce en Bretagne et de la description des données, il semble s'agir à chaque fois de mâles en migration (overshooting) :

- 1 chanteur à Saint-Urnan (Kerpert) le 23 avril 1987
- 1 chanteur sur l'île de Bréhat le 20 avril 1993
- 1 chanteur du 18 au 22 mai 2008 à Kerzoze (Mellionec).

Bibliographie

Février Y., Maoût J. & Pulce P. (2001). Le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) en Bretagne : une population en déclin. *Ar Vran*, 12(2) : 65-74.



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.