

Roitelet à triple-bandeau

Regulus ignicapilla



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A


Le Roitelet à triple-bandeau est une espèce à distribution européenne, répartie de l'Afrique du Nord jusqu'aux Pays baltes. Il est originellement lié aux massifs boisés et fréquente plus abondamment, en France, les régions montagneuses et la moitié sud du pays (D). En Bretagne, l'espèce progresse plus ou moins rapidement depuis son apparition comme nicheur à partir des années 1950 (G). Considérée comme peu commune il y a encore une dizaine d'année, l'espèce avait même été inscrite comme déterminante ZNIEFF à l'échelle régionale. Elle est aujourd'hui en forte progression, notamment en période de reproduction, ce qui explique l'augmentation importante du nombre de données.

Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, le Roitelet à triple-bandeau peut être observé toute l'année bien que les populations fluctuent au gré des migrations. En période de nidification, le Roitelet à triple-bandeau semble désormais présent sur une grande partie du territoire départemental. Il s'agit même d'une des espèces nicheuses bretonnes ayant le plus progressé au cours des dernières décennies comme l'atteste la comparaison des deux dernières enquêtes régio-

nales où l'espèce est passée de 22 à 51 mailles occupées dans les Côtes-d'Armor (C). Cette dynamique n'est pas forcément partagée ailleurs en France où l'espèce semble même parfois en régression, avec une tendance nationale plutôt à la baisse depuis le début des années 2000 (D; J). En revanche, la dynamique anglaise est très certainement à relier à ce qui s'observe en Bretagne avec une apparition comme nicheur en 1962 et une forte progression notée ces dernières années (Wynn *et al.*, 2012).

Les études menées en Côtes-d'Armor révèlent que cette progression concerne tous les types de milieux boisés puisque l'espèce se reproduit aussi bien dans les résineux (où il côtoie souvent le Roitelet huppé) que dans les boisements de feuillus, les parcs urbains, les jardins... surtout s'ils sont riches en houx et en lierre. Durant l'enquête menée en 2012 sur Saint-Brieuc et Plérin, l'espèce a ainsi été contactée sur un tiers des points échantillonnés, se révélant même commune dans les vallées qui traversent l'agglomération et sur le littoral (P). Au printemps 2014, des quadrats réalisés dans des vallons littoraux boisés favorables à l'espèce ont montré des densités très importantes avec près de



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Roitelet à triple-bandeau

Regulus ignicapilla



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

10 chanteurs pour 10 ha à Matignon et Plouër-sur-Rance (**GEOCA, 2014**).

En période de migration, l'espèce peut être observée dans des secteurs assez ouverts et buissonnants, notamment sur le littoral et les îles (cap Fréhel, Erquy, pointe du Roselier, Bréhat...). Des regroupements peuvent alors compter parfois jusqu'à une dizaine d'individus voire plus dans un même buisson. Le pic de passage est atteint en octobre.

En hiver, il est probable que des oiseaux issus des populations nordiques se mêlent aux nicheurs locaux, sans doute en grande partie sédentaires (**D**). La distribution en hiver est relativement proche de celle observée en période de reproduction et les manques trahissent plus vraisemblablement des défauts de prospection. A noter qu'à cette période l'espèce fréquente aussi bien des milieux fermés (massifs forestiers) que des milieux semi-ouverts (fourrés littoraux, bords d'étangs, zones humides..).

Tendances et perspectives

Le Roitelet à triple-bandeau est l'une des espèces dont l'accroissement a été parmi les plus nets et spectaculaires de l'avifaune costarmoricaine et


bretonne au cours des années 2000, rejoignant en cela les observations réalisées outre-manche (**Wynn et al., 2012**). C'est surtout l'abondance en tant que nicheur qui se révèle en forte hausse au vu des études menées un peu partout dans le département. Les quadrats et suivis IPA conduits dans des milieux très divers (littoral, landes, massifs forestiers, milieux urbains, carrières,...) révèlent une plasticité de l'espèce à des biotopes très variés, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui bien mieux répartie que le Roitelet huppé qui reste, lui, cantonné aux boisements de résineux. L'espèce n'apparaît pas menacée et son appartenance à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF ne paraît plus justifiée aujourd'hui.

Bibliographie

GEOCA (2014). Diagnostics avifaunistiques de deux ENS du département des Côtes-d'Armor: la vallée du Moulin à Mer (Matignon) et le bois de Rigourdaine (Plouër-sur-Rance). Année 2014. Conseil Général des Côtes-d'Armor.

Wynn R.B., Ward M. & Adams M.C. (2012). The increasing Firecrest population in the New Forest, Hampshire. *British Birds*, 105: 273-275.

Roitelet triple-bandeau Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de *GEOCA (2014)*. Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département

