

Roitelet huppé

Regulus regulus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, le Roitelet huppé se distribue largement en Eurasie. En France, il s'agit d'un nicheur commun (1 million de couples dans les années 2000) qui colonise préférentiellement les boisements résineux et un migrateur et hivernant également commun (**D**). Les populations sédentaires sont renforcées en hiver par des oiseaux originaires d'Europe du Nord et de l'Est (**D**). En Bretagne, les nicheurs sont essentiellement sédentaires et semblent plus abondant dans la partie nord-ouest de la région (**C**). De mi-septembre à mi-novembre, mais aussi au printemps, d'importants mouvements migratoires sont notés sur les îles et le littoral (**C**).


Statut en Côtes-d'Armor

En Côtes-d'Armor, le Roitelet huppé est un nicheur sédentaire très commun dans les boisements de résineux, qu'il s'agisse de vastes plantations monospécifiques parfois jeunes, de haies arbustives

ou même de petits îlots de conifères situés au sein de parcelles de feuillus. Les plantations monospécifiques de résineux lui ont particulièrement réussi puisqu'il s'agit souvent de l'espèce la plus abondante dans ce type de parcelles. Les plantations qui ont suivi l'ouragan de 1987 sont notamment fortement colonisées comme à Bois Meur (**GEOCA, 2014**). D'autres études menées sur des habitats proches ont également montré cette prédominance de l'espèce: plantations de sapins en forêt de Lorges, plantations de pins au cap d'Erquy... Des abondances sont parfois estimées en linéaire parcouru: 40 sur 6 km en forêt de Lorge le 10 octobre 1991, 30 sur 8 km de la même forêt le 30 décembre 1990...

En période migratoire, le Roitelet huppé peut également être observé dans des habitats plus diversifiés et ouverts et notamment sur le littoral. On le découvre alors régulièrement dans des fourrés, saulaies et diverses haies, notamment lors du pic

Roitelet huppé Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Roitelet huppé

Regulus regulus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

migratoire en octobre et novembre : 50 sur l'île des Hébihens (Saint-Jacut-de-la-Mer) le 2 novembre 2004, 50 autour du phare du cap Fréhel (Plévenon) le 12 novembre 1983, 20 à Ploumanac'h (Perros-Guirec) le 15 septembre 1989...

démographique et à son omniprésence dans certains boisements quasi monospécifiques, notamment dans le nord-ouest de la région. Sa tendance suivra donc logiquement celle de ce type d'habitat qui semble encore avoir de beaux jours devant lui.


Tendances et perspectives

En Europe, le Roitelet huppé subit un déclin modéré avec des variations contrastées selon les pays (B). En France, le Roitelet huppé connaît de fortes variations d'abondance interannuelles probablement liées aux rigueurs hivernales et il a globalement subi un déclin de -41 % au cours des années 2000 (J). La plantation massive de résineux en Bretagne a contribué à son expansion géographique et

Bibliographie

GEOCA (2014). Suivi du peuplement avifaunistique nicheur de l'Espace Naturel Sensible de la forêt départementale d'Avaugour/Bois-Meur (Côtes-d'Armor – année 2013). Richesse et évolution du peuplement. Influence des accrus forestiers sur l'avifaune nicheuse de jeunes parcelles de résineux. Conseil Général des Côtes-d'Armor. 90 p.

Roitelet huppé Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE

