

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor


G.E.O.C.A

Espèce polytypique, le Rossignol philomèle se reproduit dans l'ouest Paléarctique (**D**). Les effectifs européens sont estimés entre 4 et 12 millions de couples (**B**). En France, l'espèce est largement distribuée et considérée comme un nicheur et migrateur commun avec 500 000 à 1 million de couples dans les années 2000 (**D**). Il manque sur les reliefs, dans une grande partie de la Bretagne et du Cotentin (**D**). En Bretagne, l'espèce semble toujours s'être concentrée au quart sud-est, même si l'espèce colonisait tous les départements jusqu'au début du XX^e s. (**G**). En 1980-1985, il occupe encore une grande partie de l'Ille-et-Vilaine et le littoral morbihannais (**A**). En revanche, la dernière enquête régionale montre une contraction de l'aire de répartition régionale avec une disparition de l'espèce dans l'ouest morbihannais, la moitié nord de l'Ille-et-Vilaine et la marge orientale des Côtes-d'Armor (**C**).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Rossignol philomèle est un nicheur disparu des Côtes-d'Armor et un migrateur très rare. Avant 1970, on ne dispose que de peu de données permettant de statuer sur sa présence et son abondance même si la forêt de La Hunaudaye semble

avoir fourni des données (**G**), de même que Morieux (3 mâles chanteurs en juin 1967). Dans les années 1970, l'espèce fournit des indices de nidification dans des vallons boisés à Morieux, Hillion (plage de Bon Abri), Ploufragan, Jugon-les-Lacs, Plouasne, Evran et Saint-Jouan-de-l'Isle. Dans les années 1980, ces mêmes 3 secteurs distincts fournissent toujours des données: barrage de Rophémel (Guitté), Evran, Plouasne, Jugon-les-Lacs, Bon Abri (Hillion), Morieux, vallée du Gouët (Saint-Brieuc) mais aussi Lancieux. Dans les années 1990, les données se réduisent et l'espèce est surtout notée à Jugon-les-Lacs et à la marge orientale du département dans le secteur du barrage de Rophémel (Plouasne et Saint-André-des-Eaux). Un chanteur est également noté en mai 1991 au Vau-madeuc (Pordic). L'année 1990 fournit le seul indice de reproduction certaine du département (1 couple accompagné d'un jeune volant le 14 août 1990 au pont de la Rance à Plouasne). L'année 1997, quant à elle, fournit les derniers indices de reproduction dans le département à Saint-André-des-Eaux. En 2001, des recherches ciblées dans un secteur anciennement occupé à Jugon-les-Lacs ne fournissent aucun contact. Depuis 2002, les quelques mentions



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Côtes d'Armor
le Département



Région
BRETAGNE



Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

ou observations de l'espèce se rapportent exclusivement à des migrateurs au passage prénuptial (avril et mai) ou postnuptial (mi-juillet à début septembre). Ce dernier passage est sans doute moins détecté du fait du silence des oiseaux mais la pression de prospection en fond de baie de Saint-Brieuc au cours des années 2010 révèle tout de même la régularité de l'espèce: 1 chanteur à Béliard (Morieux) le 8 mai 2011, 1 à la pointe de Longue Roche (le même?) (Morieux) le 15 mai 2011, 1 le 30 août 2011 à Saint-Maurice (Morieux), 1 le 1^{er} septembre 2011 à la Grève des Courses (Langueux), 1 le 7 septembre 2012 à la Grève Vauglin (Planguenoual) et 1 le 16 juillet 2014 à la Grève des Courses (Langueux). En dehors de ce secteur, signalons 1 ind. à Kerguscoat (Trévou-Tréguignec) le 9 avril 2002, 1 à Montbran (Pléboulle) le 1^{er} juillet 2002 et 1 sur l'île aux Moines (Perros-Guirec) le 23 avril 2008. Les arrivées dans le département sont notées entre le début avril (plus précoce le 2 avril 1973) et le mois de mai (des migrateurs encore notés à la mi-mai).

Tendances et perspectives

En Europe et en France, les effectifs de Rossignol philomèle sont jugés stables après un fort déclin dans les années 1980 (**B**; **J**). La rétractation de la marge de distribution de l'espèce en France a directement touché le département des Côtes-d'Armor où elle était assez peu implantée et localisée à quelques noyaux de population dans des zones très favorables, riches en étangs et vallons boisés présentant des faciès ensoleillés (environ de Rophémel, Jugon-les-Lacs, Morieux...). Au vu de sa remontée récente dans quelques régions, il n'est donc pas impossible que le Rossignol philomèle, qui est encore bien présent dans la moitié sud de l'Ille-et-Vilaine, regagne du terrain comme nicheur et recolonise d'anciens bastions.

Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

