

Sarcelle d'été

Anas querquedula



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce monotypique, la Sarcelle d'été se distribue à travers l'Eurasie, de la France au Japon et hiverne en Afrique sahélienne (**D**). En France, il s'agit d'une nicheuse rare (250 à 300 couples dans les années 2000), d'une migratrice peu commune et d'une hivernante occasionnelle (**D**). En Bretagne, la Sarcelle d'été est une nicheuse rare (5 à 17 couples sur la période 2004-2008) et localisée (**C**) mais est plus commune en migration pré et postnuptiale, toujours en faibles effectifs toutefois.

Statut en Côtes-d'Armor

La Sarcelle d'été est surtout une espèce migratrice observée en Côtes-d'Armor au printemps et à la fin de l'été. Un seul site a fourni quelques indices de reproduction possible à probable dans les années 1980: l'étang de Bosméléac mais la reproduction n'y a jamais été prouvée (**E**).


La phénologie de l'espèce est assez nette dans le département. Le passage est comme ailleurs en Bretagne, plus marqué au printemps et notamment en mars (34 % des données) et avril (28 %). Les quelques données de mai correspondent à des indices possibles ou probables de reproduction. A partir de la fin juillet (2 données), des oiseaux peuvent être observés en migration postnuptiale mais surtout en août (22 %). Quelques données

plus éparses sont encore obtenues en septembre. Deux données tardives se rapportent sans doute aux mêmes oiseaux: 2 le 17 octobre 2002 au Palud (Minihy-Tréguier) et 1 le 1er novembre 2012 à Coat Gigour (La Roche-Derrien). Les sites fréquentés en stationnement migratoire sont à la fois des vasières littorales (baie de Saint-Brieuc, baie de Paimpol, estuaire du Jaudy, estuaire de la Rance, Trébeurden) mais aussi des pièces d'eau intérieures (Plounérin, Plougras, Saint-Martin-des-Prés, étang de Bosméléac, Canihuel, Le Gouray...) et assez régulièrement des stations de lagunage pourvu que la végétation rivulaire y soit suffisante. Les observations départementales concernent uniquement des oiseaux à l'unité ou de petits groupes de 2 à 6 ind.: 6 le 26 mars 1990 à l'étang de Beffou (Plougras), 6 le 31 mars 1990 à l'étang du Moulin Neuf (Plounérin) et 6 le 14 août 1999 à la station d'épuration de Pommeret.

Tendances et perspectives

La Sarcelle d'été connaît un déclin modéré en Europe et en France où elle est classée *Vulnérable* comme nicheurs sur la Liste Rouge nationale (**B**; **U**). Toutefois, l'absence d'indices de reproduction en Côtes-d'Armor et les effectifs très réduits en migration ne permettent pas de définir un réel intérêt local pour l'espèce.

Sarcelle d'été Distribution (1983-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.